

# 早期人工流產的選擇

	墮胎片劑/藥物流產 (抗早孕藥物 米非司酮 和 米索前列醇)	手術流產或墮胎 (負壓吸引術-吸宮術)
懷孕多長時間我還能墮胎?	月經停止後9周以內	月經停止後12周以內
墮胎都會發生些什麼?	<p>在家墮胎。</p> <p>你將在醫生診所服用墮胎藥 (米非司酮) 。大多數女士服用米非司酮後感覺正常。個別人服用後感覺惡心。</p> <p>服用米非司酮6-72小時以後，你在家服用米索前列醇。</p> <p>孕娠終止過程在服用米索前列醇後的1-4小時開始。你會大量出血並伴隨腹痛，持續數小時。</p> <p>大約1星期以後，回醫生處復診。</p>	<p>手術在醫生門診實施。</p> <p>實際墮胎手術時間大約5-10分鐘。</p> <p>醫生將手術器械伸入你的陰道和子宮清除受孕。</p> <p>手術後1-2周後到你的定期醫生處復診。</p>
有多痛?	墮胎過程中，婦女會有時斷時續的中等程度到非常強烈的腹痛。止痛片可止痛。	手術時婦女會有中等程度到非常強烈的腹痛。止痛片可止痛。
會留多少血?	墮胎過程中，通常會有帶血塊的大量流血。之後，在1-2周或更長時間，你會有時斷時續的輕度流血。	大多數婦女會有1-7天的輕度流血。時斷時續的流血可能持續數周。
要花多少錢?	兩種墮胎方式的準確收費額，取決于你去哪兒。	
墮胎會失敗嗎?	墮胎藥的成功率在98-99%。如果墮胎藥失敗，你必須作人工流產手術。	它的成功率在99%。如果手術失敗，你必須再次手術。
墮胎後，我還可以再要孩子（懷孕）嗎?	可以。兩種墮胎方法都不會降低你懷孕或未來受孕的可能。	

	墮胎片劑/藥物流產 (抗早孕藥物 米非司酮 和 米索前列醇)	手術流產或墮胎 (負壓吸引術-吸宮術)
墮胎安全嗎?	兩種墮胎藥已經安全使用超過10年。很少有大問題。藥物避孕比繼續妊娠要安全至少10倍。	人工手術流產已經安全實施超過25年。在第一個12周內作人工流產極少發生問題。人工流產比繼續妊娠要安全至少10倍。
好處有哪些?	<p>不必打針，麻醉，或者讓手術器械進入你的體內。</p> <p>它更自然，就象小產一樣。</p> <p>和人工手術流產相比，它可以更早期作。</p> <p>和到診所比，在家里墮胎有更多隱私。</p> <p>你可以選別人陪伴，也可以獨處。</p>	<p>它只需要幾分鐘。</p> <p>成功率達到99%。</p> <p>流血比藥物墮胎少。</p> <p>手術期間，醫護人員隨侍身邊。</p> <p>還會有顧問在場幫助。</p> <p>和墮胎藥相比，人工流產可以在懷孕的比較晚期進行。</p>
壞處有哪些?	<p>它需要1-2天才能完成墮胎。</p> <p>藥物墮胎因人而異。</p> <p>流血可非常多，持續時間比人工手術流產長。</p> <p>和人工流產相比，腹痛可劇烈和長久些。</p> <p>和人工流產相比，墮胎藥只能在懷孕早期使用。</p> <p>它對輸卵管妊娠（宮外孕）不起作用。</p>	<p>醫生必須把手術器械進入子宮。</p> <p>麻醉和止痛藥可產生副作用。</p> <p>你對手術過程和陪同人員較少控制和選擇。</p> <p>負壓吸宮術會很噪雜。</p> <p>和藥物墮胎相比，人工流產不能在懷孕的早期進行。</p> <p>它對輸卵管妊娠（宮外孕）不起作用。</p>