

Opções de aborto no Início da Gravidez

	Comprimido Abortivo / Medicação de Aborto (Com Mifepristone e Misoprostol)	Aborto por Aspiração
Até que fase da gestação eu posso estar?	Até 9 semanas à partir do primeiro dia da última menstruação	Até 12 semanas à partir do primeiro dia da última menstruação
O que acontecerá?	<p>O aborto ocorre em casa.</p> <p>No consultório, você toma o comprimido abortivo (mifepristone). A maioria das mulheres se sentem bem após tomarem o mifepristone. Algumas mulheres sentem náuseas.</p> <p>Em casa, 6-72 horas depois, você insere os comprimidos de misoprostol.</p> <p>O aborto inicia 1-4 horas depois de você ter usado o misoprostol. Você terá sangramento e cólicas fortes por algumas horas</p> <p>Você retorna ao consultório após 1 semana.</p>	<p>O aborto ocorre no consultório.</p> <p>O tempo real do procedimento de aborto leva de 5 à 10 minutos.</p> <p>O médico introduz os instrumentos na vagina e no útero para interromper a gravidez.</p> <p>Você retorna ao seu clínico geral ou ao consultório onde realizou o aborto após 1-2 semanas.</p>
Isto é doloroso?	As mulheres têm cólicas suaves a muito fortes e intermitentes durante o aborto. Os analgésicos ajudam.	As mulheres têm cólicas suaves a muito fortes durante o aborto. Os analgésicos ajudam.
Quanto eu vou sangrar?	Sangramento forte com coágulos é comum durante o aborto. Depois disso, um sangramento mais leve, intermitente pode continuar por 1-2 semanas ou mais.	A maioria das mulheres têm sangramento leve por 1-7 dias. Um sangramento intermitente pode continuar por algumas semanas.
Quanto isto custa?	Para ambos os tipos de aborto, o custo exato depende de onde você for.	
O aborto pode falhar?	Os comprimidos funcionam 98-99% das vezes. Se os comprimidos falharem, você deverá fazer um aborto por aspiração.	Este funciona 99% das vezes. Se falhar, você deverá repetir o aborto por aspiração.
Eu ainda poderei ter filhos depois?	SIM. Nenhum tipo de aborto diminui sua probabilidade de engravidar ou de manter uma gravidez no futuro.	

**Comprimido Abortivo /
Medicação de Aborto**
(Com Mifepristone e Misoprostol)

Aborto por Aspiração

Isto é seguro?

Ambos os comprimidos têm sido utilizados com segurança por mais de 10 anos. Maiores problemas são raros. O aborto por medicação é, no mínimo, 10 vezes mais seguro do que continuar uma gravidez.

O aborto por aspiração tem sido feito com segurança por mais de 25 anos. O aborto feito nas primeiras 12 semanas causa pouquíssimos problemas. O aborto é, no mínimo, 10 vezes mais seguro do que continuar uma gravidez.

Quais são as vantagens?

Você não tomará injeções, anestesia nem terá instrumentos introduzidos em seu corpo.

Pode parecer mais natural, como um aborto espontâneo.

Isso pode ser realizado mais cedo na gravidez do que um aborto por aspiração.

Estar em casa em vez de em um consultório oferece mais privacidade.

Você pode optar por ter alguém com você ou por ficar sozinha.

Este dura apenas alguns minutos.

Este funciona 99% das vezes.

Você nota menos sangramento do que teria com o aborto por medicação.

O pessoal da equipe médica fica com você durante o aborto.

Este pode ser realizado mais tarde na gravidez do que o aborto por medicação.

Quais são as desvantagens?

Se leva de 1-2 dias para completar o aborto.

Não é o mesmo para todas as mulheres.

O sangramento pode ser muito forte e pode durar mais tempo do que com o aborto por aspiração.

As cólicas podem ser severas e durarem mais tempo do que com o aborto por aspiração.

Este não pode ser feito tão tarde na gravidez quanto o aborto por aspiração.

Este não pode interromper uma gravidez tubária.

O médico precisa introduzir instrumentos dentro do útero.

Os anestésicos e os analgésicos podem ter efeitos colaterais.

Você tem menos controle sobre o procedimento do aborto e sobre quem ficará com você.

O aspirador a vácuo pode parecer barulhento.

Este não pode ser feito tão cedo na gravidez quanto o aborto por medicamento.

Este não pode interromper uma gravidez tubária.