

# Comparativo de Dos Tipos de Aborto Durante el Primer Trimestre de Embarazo

|  | <b>Píldora Abortiva/<br/>Aborto Médico<br/>(con Mifepristone o Mifeprex)</b>   | <b>Aborto Quirúrgico<br/>(por Aspiración)</b>  |
|--|--|--|
| <b>¿A cuantas semanas de embarazo se administran los distintos procedimientos abortivos?</b> | Se administra hasta 9 semanas desde el primer día de su último período.  | Se administra hasta 12 semanas desde el primer día de su último período.   |
| <b>¿Que pasará?</b>  | <p>El aborto ocurre en su casa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>En el consultorio médico</i> tomará la primera pastilla (mifepristone). Es probable que no sentira nada después de tomar las pastilla. Algunas mujeres siente nausea.</li> <li>• <i>En casa</i>, 12-72 horas después. colocará el segundo medicamento, las pastillas de misoprostol.</li> <li>• El aborto se iniciara dentro de 1 – 4 horas después de usar el misoprostol. Es probable que sangrará y tendra cólicos durante varias horas.</li> <li>• Tendrá una consulta médica de seguimiento en una semana.</li> </ul> | <p>El aborto ocurre en el consultorio médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El procedimiento se realizara por total dentro de 5 a 10 minutos.</li> <li>• El médico utilizará instrumentos que se introducen en la vagina y utero para remover el embarazo.</li> <li>• Regresará en 1 a 2 semanas después del procedimiento al consultorio de su médico o a una clínica médica.</li> </ul> |
| <b>¿Qué tan doloroso puede ser?</b>  | Mujeres tienden a tener cólicos moderados a muy dolorosos que ocurren de vez en cuando. Se recomienda tomar analgésicos para disminuir el dolor.   | Mujeres tienden a tener cólicos moderados a muy dolorosos durante el procedimiento del aborto. Se recomienda tomar analgésicos para disminuir el dolor.  |
| <b>¿Hay mucho sangrado?</b>  | Es común que durante el aborto haya sangrado abundante e incluso coágulos. Después, entre 1 a 2 semanas habra un poco de sangre con algunos coágulos.  | La mayoría de mujeres sangran ligeramente entre 1 y 7 días. El sangrado puede durar por varias semanas.  |
| <b>¿Cuánto cuesta?</b>   | Para los dos tipos de aborto el costo depende del lugar a dónde acuda.   |  |
| <b>¿Podría fallar el procedimiento?</b>  | Las pastillas tienen una tasa de éxito de 98-99 por ciento. Si no interrumpe el embarazo, tiene que hacerse un aborto quirúrgico.  | El procedimiento tiene mas del 99 por ciento de éxito. Si no se interrumpe el embarazo por completo tendra que repetirlo.  |

**Píldora Abortiva/  
Aborto Médico**  
(con *Mifepristone* o *Mifeprex*)

**Aborto Quirúrgico**  
(por Aspiración)

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>¿Podre tener hijos después?</b></p>  | <p>SI. Ninguno de los dos tipos de aborto afecta la posibilidad de embarazos futuros.</p>   |  |
| <p><b>¿Qué tan seguro es?</b></p>          | <p>Los dos medicamentos han sido utilizados por mas de 10 años. Las complicaciones sólo se presentan en raras ocasiones. Tener un aborto médico es 10 veces mas seguro que los riesgos a la salud materna durante un embarazo.</p>  | <p>Hace más de 25 años que se realizan abortos quirúrgico de form segura. Los abortos durante las primeras 12 semanas presentan muy pocos problemas y es por lo menos 10 veces más seguro que los riesgos a la salud materna durante un embarazo</p>   |
| <p><b>¿Qué ventajas tienen?</b></p>        | <p>No necesita inyecciones, ni anestesia, ni se le introducen instrumentos en su cuerpo, a menos que falle el procedimiento.</p> <p>Para algunas mujeres les parece más natural, es similar a un aborto espontáneo.</p> <p>Hacerlo en la casa y no en un consultorio puede ser más cómodo y privado.</p> <p>Cualquier persona dé apoyo puede estar presente durante el proceso de aborto.</p>               | <p>Es muy rápido y puede terminar en pocos minutos.</p> <p>Sus posibilidades de fallar son muy pocas.</p> <p>La mujer ve menos sangre en comparación con el aborto con la píldora abortiva.</p> <p>Hay personal médico presente.</p> <p>El embarazo puede estar más avanzado en comparación con el aborto con la píldora abortiva.</p>   |
| <p><b>¿Cuáles son sus desventajas?</b></p> | <p>Toma 1-2 días completar el aborto.</p> <p>No es igual para cada mujer.</p> <p>El sangrado puede ser muy abundante y durar por más tiempo, en comparación al aborto quirúrgico.</p> <p>Los cólicos pueden ser dolorosos y generalmente duran más, en comparación al aborto quirúrgico.</p> <p>No se puede usar en caso de un embarazo mas avanzado.</p> <p>No puede interrumpir un embarazo ectópico.</p> | <p>Personal médico tiene que insertar instrumentos en el útero.</p> <p>La anestesia y analgésicos pueden tener efectos secundarios.</p> <p>La mujer tiene menos control sobre el proceso y de quién la puede acompañar.</p> <p>La máquina aspiradora podría parecer ruidosa.</p> <p>No puede practicarse en las primeras semanas de embarazo como en el caso del aborto con la píldora abortiva.</p> <p>No puede interrumpir un embarazo ectópico.</p> |