

조기에 낙태할 수 있는 방법

	낙태용 알약/약을 이용한 낙태 방법 (With Mifepristone 그리고 Misoprostol)	흡인 낙태 방법 (흡입식 혹은 진공 흡인 방법)
임신한 지 얼마만에 낙태할 수 있나?	마지막 생리가 끝난 첫날 부터 9주 까지 가능	마지막 생리가 끝난 첫날 부터 12주 까지 가능
어떻게 이루어 지나?	집에서 낙태를 할 수 있다. 병원에서, 낙태용 알약(mifepristone)을 복용한다. Mifepristone을 복용한 후 대부분의 여성들은 괜찮으나 어떤 여성들 에게서는 구역질이 난다. 집에서 6-72시간 후, mifepristone을 질 속에 집어 넣는다. Mifepristone을 집어 넣은 후 1-4시간 후에 낙태가 시작된다. 몇 시간 동안 심한 출혈이 있고 통증이 있다. 일주일 후 병원에 온다	병원에서 낙태 시술을 한다. 실질적인 낙태 시술은 5-10분 정도 걸린다. 의사가 임신한 것을 없애기 위해 질과 자궁속에 기구를 집어 넣는다. 낙태 시술 후 1-2주 후 주치의나 낙태 시술한 병원에 온다.
통증은 어떤가?	낙태 중 보통에서 심한 통증이 있거나 없어 지기도 한다. 진통제를 복용하며 통증을 없앤다.	낙태 중 보통에서 심한 통증을 호소한다. 진통제를 복용하며 통증을 없앤다.
출혈이 얼마나 되나?	낙태중 종종 핏 덩어리를 포함하여 과다 출혈이 보이곤 한다. 그 이후, 1-2주나 그 이상 기간 동안 가끔씩 조금 출혈이 나타난다.	대부분의 여성은 1-7일 동안 조금 출혈이 있다. 몇 주 동안 간헐적으로 출혈이 있을 수 있다.
비용은 얼마나 드나?	두 종류의 낙태 방법에 필요한 정확한 비용은 어디에서 시술을 받느냐에 따라 비용의 차이가 난다.	
낙태가 실패할 수도 있나?	약을 복용하여 98-99%의 낙태 성공률을 보인다. 만일 약을 사용하는 방법으로 실패하면 흡인 낙태 시술을 하여야 한다.	99%의 성공률을 보인다. 만일 실패할 경우 흡인 낙태 시술을 다시 반복해야 한다.
낙태 후 다시 임신할 수가 있나?	그렇다. 이 두가지의 방법을 사용하여 낙태를 하였어도 현재 임신할 수 있는 확률이나 미래에 임신할 수 있는 확률이 줄지는 않는다.	

낙태용 알약/약을 이용한 낙태 방법
(With Mifepristone 그리고 Misoprostol)

흡인 낙태 방법
(흡입식 혹은 진공 흡인 방법)

안 전 한가?

약을 이용한 낙태 방법은 지난 10년 이상 안전하게 사용 되었다. 큰 문제가 없다. 약을 이용한 낙태 방법은 계속 임신 상태로 위험하게 있는 것보다 적어도 10배 이상 안전하다.

흡인 낙태 방법은 지난 25년 간 안전하게 시술 되었다. 임신한 지 12주 까지는 낙태 시술을 하여도 거의 문제가 발생하지는 않는다.
이 흡인 낙태 시술 방법은 계속 임신 상태로 위험하게 있는 것보다 적어도 10배 이상 안전하다

유리한 점은 무엇인가?

몸에 주사, 마취 또는 기구를 사용할 필요가 없다.
유산한 것처럼 자연스러운 느낌을 가진다.
흡인 낙태 시술 방법보다 더 빠른 임신 초기에 사용할 수 있다.
병원이 아닌 가정에서 할 수 있으므로 사생활이 보호된다.
다른 사람의 도움을 받을 수도 있고 혼자서도 할 수 있다.

짧은 시간에 이루어 진다.
성공률이 99%에 가깝다.
약물을 이용한 낙태 방법보다 출혈이 적을 수 있다.
낙태 시술하는 동안 의료진이 함께 있어 안전하다.
상담원이 함께 있어 도와줄 수 있다.
약물 사용 낙태 방법보다 임신한 후 한참 지난 후에도 이 시술 방법으로 낙태가 가능하다.

해로운 점은 무엇인가?

완전히 낙태하는데 1-2일 걸린다.
모든 여성들에게 똑같은 효과가 나타나지 않는다.
출혈이 심할 수 있으며 흡인 낙태 시술 방법보다 더 많은 기간 동안 출혈이 생길 수가 있다.
통증이 심할 수 있으며 흡인 낙태 시술 방법보다 더 오래 지속될 수 있다.
흡인 낙태 시술 방법은 임신한 후 한참 지난 후에도 사용할 수 있으나, 임신한 후 한참 지나면 이 방법을 사용할 수 없다.
나팔관 임신 할 가능성이 있다.

의사가 자궁안에 기구를 삽입하여야 한다.
마취나 진통제를 사용하므로 휴유증이 생길 수가 있다.
낙태 시술 과정에서 의료진에게 전적으로 맡길 수 밖에 없다.
진공 흡인기 때문에 소음이 생긴다.
약물을 이용한 낙태 처럼 임신 초기에는 이 시술 방법을 사용할 수 없다.
니팔관 임신 할 가능성이 있다.