

# Anticonceptivo de Emergencia y Aborto Médico: ¿Cuál es la Diferencia?

	<b>Anticonceptivo de Emergencia</b>	<b>Píldora Abortiva/ Aborto Médico (Mifepristone/RU-486)</b>
<b>¿Qué hacen?</b>	<i>Previene</i> el embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección.	<i>Termina</i> un embarazo.
<b>Nombres o marcas de las píldoras</b>	Levenogestrel (Plan B®)	Mifepristone ( <i>Mifeprex</i> ®) Misoprostol (Cytotec®)
<b>¿Qué contienen las píldoras?</b>	Plan B® contiene progestágeno, una de las hormonas que se encuentra en las pastillas anticonceptivas que se toman al diario.	Mifepristone contiene el medicamento denominado mifepristone que causa que el desarrollo del embarazo termine. Misoprostol contiene misoprostol que causa las contracciones.
<b>¿Cuándo se toman?</b>	Para óptimos resultados, se recomienda tomar las pastillas cuanto antes posible después de una relación sexual sin protección. Las pastillas funcionan hasta 5 días después de la relación sexual. Las dos pastillas se pueden tomar a la misma vez o puede tomar una y después de 12 horas toma la segunda.	Las pastillas se toman entre las primeras 9 semanas después de su última menstruación. La primera pastilla se le administra durante su consulta médica. Tomará el segundo medicamento en casa.
<b>¿Que ocurre con su cuerpo?</b>	La mayoría de las mujeres se sienten bien. Algunas mujeres sienten náusea, vómito, cansancio, dolor de cabeza, mareo y dolor de los pechos. Puede que su siguiente regla se adelante o se atrase unos días.	Después de tomar la primera pastilla muchas mujeres se sienten bien. Después de tomar el segundo medicamento en casa va sangrar mucho y es probable que tendrá coágulos. Esto durará dos o tres horas. Después, puede que por 1-3 semanas haya un sangrado ligero. El dolor puede variar entre cólicos intermitentes ligeros a muy fuertes. Ayuda tomar analgésicos.
<b>¿Son eficaces?</b>	El anticonceptivo de emergencia reduce la posibilidad de quedar embarazada entre 85-99%, dependiendo de tan pronto toma las pastillas.	La tasa de éxito es de 98-99%. En caso de fallar se requiere un aborto de succión.
<b>¿Cuánto cuesta?</b>	Plan B® cuesta entre \$28 - \$50 dólares.	El costo exacto depende de dónde vaya.

	<b>Anticonceptivo de Emergencia</b>	<b>Píldora Abortiva/ Aborto Médico (Mifepristone/RU-486)</b>
<b>Cobertura del seguro</b>	No todos los seguros cubren Plan B, sobretodo si se compra sin receta médica. Averigüe con su plan de seguro.	Muchos planes de seguro ahora cubren el aborto médico.
<b>¿Dónde las encuentro?</b>	Se consigue Plan B en la farmacia sin receta si eres mayor de 17 años. Si eres menor de 18 años requieres receta médica. Pregunte al personal médico que la atiende o llame al (888) NOT-2-LATE o visite <a href="http://www.not-2-late.com">www.not-2-late.com</a>	Preguntele al personal médico que la atiende, llame al (800) 772-9100 o <a href="http://www.prochoice.org/pregnant/find/">www.prochoice.org/pregnant/find/</a>