

# 早期堕胎可选方案

	<b>堕胎药：</b> <b>米非司酮和米索前列醇</b>	<b>吸引流产</b> <b>(吸引或负压吸引)</b>
<b>怀孕时间可以为多久？</b>	从上次例假第一天算起最多11周。	从最后一次月经的第一天起不超过12周。
<b>将会发生什么情况？</b>	<p>流产在家里进行。</p> <p>你在对你最合适的时间口服第一粒堕胎药（米非司酮）。</p> <p>在服用第一粒药后，你可能感觉良好。您也可能会出现恶心。</p> <p>之后，你塞入四粒米索前列醇。</p> <p>在塞入米索前列醇几个小时后，痉挛和流血开始。你会有严重的流血和痉挛。</p> <p>后续你不需要例行地到诊所就诊。你可以在一两个星期后，与你的医师打电话或面访。</p>	<p>流产在诊所进行。</p> <p>实际的流产手术时间为5-10分钟。</p> <p>医师把器械工具放入你的阴道和子宫，清除妊娠物。</p> <p>后续你不需要例行地到诊所就诊。你可以在一两个星期后，与你定期看病的医师打电话或面访，或者在你堕胎的诊所面访。</p>
<b>疼痛程度如何？</b>	在流产过程中，您可能会不时出现轻度至重度腹痛。止痛药会有帮助。	在流产过程中，您可能会出现轻度至重度腹痛。止痛药会有帮助。
<b>出血量有多大？</b>	在流产过程中，预计会大量出血（带有血块）。之后，可能会继续不时出现轻微出血，持续几周。	您可能会出现轻微出血，持续1-7天。可能会继续不时出血，持续几周。
<b>需要多少费用？</b>	对于两种类型的流产而言，确切的费用都取决于在哪里进行流产。	
<b>流产是否会失败？</b>	流产药的效果达98-99%。如果失败，则必须进行流产手术。	效果达99%。如果失败，则必须再次进行流产手术。
<b>以后是否仍然可以生孩子？</b>	<b>是的。</b> 两种类型的流产都不会降低未来受孕或怀孕的几率。	

# 早期堕胎可选方案

	<b>堕胎药：</b> 米非司酮和米索前列醇	<b>吸引流产</b> (吸引或负压吸引)
<b>是否安全？</b>	两种药都是安全的。大问题很罕见。	负压吸引流产术是安全的。前12个星期内堕胎带来极少问题。
<b>须知事项</b>	<p>完成堕胎需要一两天。</p> <p>流血可能很多，可能比负压吸引流产术持续时间长。</p> <p>你不用打针、麻醉，身体也不使用器械。</p> <p>在家而不是在诊所会感觉更私密。</p> <p>你可以选择有人陪伴，也可以自己一个人。</p> <p>不能作为怀孕晚期的堕胎手术。</p> <p>痉挛可能严重，可能比堕胎手术持续时间长。</p> <p>可能感觉更自然，像一次流产。</p> <p>不能终止输卵管怀孕或宫外孕。</p>	<p>几分钟就做完了。</p> <p>你看到的流血比使用堕胎药堕胎要少。</p> <p>医师需要把器械工具插入子宫内。</p> <p>你对堕胎手术的控制较少。</p> <p>你可能无法选择谁陪伴你。</p> <p>比堕胎药堕胎相比，可以在孕期更晚的时候使用。</p> <p>麻醉和止痛药可能导致副作用。</p> <p>负压吸引设备可能有噪音。</p> <p>不能终止输卵管怀孕或宫外孕。</p>

寻找堕胎服务的资源：[www.abortionfinder.org](http://www.abortionfinder.org)、[www.ineedana.com](http://www.ineedana.com)