

早期墮胎選擇

	墮胎藥： 美服培酮 (Mifepristone) 和米索前列醇 (Misoprostol)	流產手術
懷孕時間可以為多久？	從末次月經的第一天算起，最長 11 週。	從最後一次月經的第一天起不超過12週。
將會發生什麼情況？	<p>流產在家裡進行。</p> <p>在最適合您的時候服用第一片墮胎藥（美服培酮）。</p> <p>您也可能會出現噁心。您也可能會出現嘔心。</p> <p>之後，您塞入四片米索前列醇。</p> <p>塞入米索前列醇幾小時後會開始痙攣和出血。您會大出血和痙攣。</p> <p>您不需要進行例行後續看診。您可以在 1-2 週後打電話或親自到您的臨床醫生處看診。</p>	<p>流產在診所進行。</p> <p>實際的流產手術時間為5-10分鐘。</p> <p>您的臨床醫生會將工具放入您的陰道和子宮來移除懷孕。</p> <p>您不需要進行例行後續看診。您可以在 1-2 週後打電話或親自到您的常規臨床醫生或您墮胎的診室看診。</p>
疼痛程度如何？	在流產過程中，您可能會不時出現輕度至重度腹痛。止痛藥會有幫助。	在流產過程中，您可能會出現輕度至重度腹痛。止痛藥會有幫助。
出血量有多大？	在流產過程中，預計會大量出血（帶有血塊）。之後，可能會繼續不時出現輕微出血，持續幾週。	您可能會出現輕微出血，持續1-7天。可能會繼續不時出血，持續幾週。
需要多少費用？	對於兩種類型的流產而言，確切的費用都取決於在哪裡進行流產。	
流產是否會失敗？	流產藥的效果達98-99%。如果失敗，則必須進行流產手術。	效果達99%。如果失敗，則必須再次進行流產手術。
以後是否仍然可以生孩子？	是。兩種類型的流產都不會降低未來受孕或懷孕的機率。	

早期墮胎選擇

	墮胎藥： 美服培酮 (Mifepristone) 和米索前列醇 (Misoprostol)	流產手術
是否安全？	兩種藥都很安全。很少會出現大問題。	引產手術很安全。在前 12 週墮胎很少會導致問題。
須知事項	<p>完成墮胎需要 1-2 天。</p> <p>出血可能非常嚴重，並且可能比引產手術持續的時間更長。</p> <p>不會對您的身體進行注射、麻醉或使用器械。</p> <p>在家裡比在診室可能會感覺更有隱私。</p> <p>您可以選擇有人陪伴人，也可以獨自一人。</p> <p>它不能像墮胎手術那樣在懷孕後期進行。</p> <p>痙攣可能非常嚴重，並且可能比墮胎手術持續的時間更長。</p> <p>它可能感覺更自然，就像流產一樣。</p> <p>它不能終止輸卵管妊娠或子宮外孕。</p>	<p>幾分鐘即可完成。</p> <p>您看到的出血比服用藥物墮胎的出血量要少。</p> <p>臨床醫生必須在子宮內插入工具。</p> <p>您對墮胎手術的掌控程度相對要少。</p> <p>您可能無法選擇讓誰陪您。</p> <p>相比於服用藥物墮胎，手術可以在懷孕後期進行。</p> <p>麻醉劑和止痛藥可能會產生副作用。</p> <p>抽吸裝置可能會發生噪音。</p> <p>它不能終止輸卵管妊娠或子宮外孕。</p>

尋找墮胎護理的資源：www.abortionfinder.org，www.ineedana.com