

我可以选择哪种早期流产治疗方法？

	观察等待	药物	手术
治疗原理是什么？	您等待妊娠组织排出体外。排出时伴有腹部绞痛和带血凝块的出血。	药物米非司酮和米索前列醇可促使妊娠组织排出。您可在家服药。	临床医生在诊室为您做一个简单的手术，将妊娠组织取出。该手术可在局部麻醉或镇静作用下完成。
将如何进行？	您等待出现腹部绞痛和出血。这些症状可能随时出现。 此绞痛和出血比月经严重得多，会持续数小时。 出血将会减轻，但仍有出血，一般持续1-2周。出血症状可能会在消失后再次出现，如此反复几次。	您将服用一片米非司酮。24小时后，您将服用止痛药以缓解绞痛和出血。然后将米索前列醇放入您的阴道中。米索前列醇可能引起恶心、腹泻和/或低热。 此绞痛和出血比月经严重得多。使用药物后约2-6小时开始出现症状。 出血将减轻，但仍有出血，一般持续1-2周，出血症状可能会在消失后再次出现，如此反复几次。	该手术在诊室内完成。 临床医生将手术器械插入您的阴道和子宫内，将妊娠组织取出。 会有轻微的出血和腹部绞痛，持续3-7天。
疼痛程度如何？	会有剧烈的腹部绞痛。 止痛药和加热垫有助于缓解腹部绞痛。	会有剧烈的腹部绞痛。 止痛药和加热垫有助于缓解腹部绞痛。	手术期间会感到腹部绞痛，疼痛程度轻微至剧烈不等。
效果如何？	这种方法成功率为66%-90%。如果已经有些许出血，更易成功。	药物的成功率为65%-90%，具体取决于流产类型和所用药物类型。*	抽吸手术成功率为98%。
用时多久？	这种方法需要几周的时间。	使用药物后84%的女性在2天内排空子宫。*	子宫在手术期间被排空，大概需要5-10分钟。
如果长时间未起效或治疗无效怎么办？	如果长时间未起效，您可以随时返回临床医生诊室，要求使用药物或接受抽吸手术。	如果治疗无效或长时间未起效，您可以返回临床医生诊室，要求接受抽吸手术或再次使用药物。	极少数情况下治疗无效，您可以返回临床医生诊室，要求再次接受抽吸手术。
是否安全？	是的。三种治疗方法均是安全的。		
这之后我是否还能怀孕？	是的。这些治疗不会影响您今后的怀孕。 早期流产结束后，您只要准备好了便可开始试着怀孕。		
早期流产的原因有哪些？	早期流产与您的自身行为无关。流产是异常妊娠自然中止的一种方式。早期流产并不是压力、运动、食物或性生活所致。		

* 米非司酮并非总是有售。联合使用米非司酮时，在2天内治疗成功率为84%，在8天内治疗成功率为89%。米索前列醇单独用药时，在2天内治疗成功率为67%，在8天内治疗成功率为84%。