

# 我對初期流產（小產）治療的選擇是什麼

	觀看並等待	用藥	流程
<b>治療的方法？</b>	等待妊娠組織通過。這會伴隨著痙攣與血塊發生。	名為保諾錠 (Mifepristone) 和喜克潰錠 (Misoprostol) 的藥丸可以幫助妊娠組織通過。您可在家使用這些藥丸。	臨床醫生會用簡單的手術來去除妊娠組織。可以使用局部麻醉或鎮靜來完成。
<b>會發生什麼事？</b>	等候發生痙攣和帶血塊的出血。這些症狀可能隨時出現。出血和痙攣可能比月經更嚴重，而且持續數小時。輕微出血通常會持續 1 到 2 週。可能會斷續幾次。	您將吞服保諾錠。24 小時後，您將服用止痛藥以緩解任何痙攣和出血症狀。然後，將喜克潰錠藥丸放入您的陰道中。喜克潰錠可能造成噁心、腹瀉和/或低燒。出血和痙攣可能比月經嚴重得多。此症狀會在服藥後約 2 至 6 小時開始。輕微出血通常持續 1 至 2 週，可能會斷續幾次。	手術會在診間進行。您的醫生會將器材放置在您的陰道和子宮內以去除妊娠組織。在 3 至 7 天內會有輕微出血和痙攣症狀。
<b>會有多痛？</b>	您會發生密集痙攣。止痛藥和暖暖包可以幫助您舒緩痙攣產生的疼痛。	您會發生密集痙攣。止痛藥和暖暖包可以幫助您舒緩痙攣產生的疼痛。	在手術過程中，可能會產生中度到重度痙攣。
<b>效果如何？</b>	成功機率為 66% 至 90%。如果您有些出血，則機率更高。	藥丸成功機率為 65% 到 90%，因小產類型與使用藥丸不同而有不同。*	吸取手術的成功機率為 98%。
<b>會花多久時間？</b>	可能會花數週時間。	藥丸可能在 2 天內清空 84% 女性的子宮。	在手術過程中會清空子宮，約耗時 5 至 10 分鐘。
<b>如果需時過久或不成功時怎麼辦？</b>	如果耗時太久，可隨時返回診間用藥或進行吸取手術。	如果不成功或耗時太久，可返回診間進行吸取手術或試著再次用藥。	在極少數案例中會發生手術不成功的情形，您可返回診間進行另一次吸取手術。
<b>它安全嗎？</b>	是的。全部三種治療選項都很安全。		
<b>我之後還能有孩子嗎？</b>	是的。這些治療不會讓您在未來無法懷孕或無法保胎。一旦初期流產結束，只要您感覺準備好了，即可開始試著懷孕。		
<b>哪些原因會造成初期流產？</b>	您無法令其發生。流產是結束不健康妊娠的自然方式。並非因為壓力、運動、食物或性而造成初期流產。		

\* 保諾錠並非隨時可取得。使用保諾錠，2 天內的整體成功率為 84%，8 天內則為 89%。單獨使用喜克潰錠，則 2 天內的整體成功率為 67%，8 天內則為 84%。