

Anticonceptivos de Emergencia: Cual AE es el apropiado para mi?

	DIU de cobre 	Pastillas de Ulipristal Acetate 	Pastillas de Progestina 
Qué es?	Anticonceptivo de emergencia (AE) es un método anticonceptivo que se puede usar después de tener relaciones sexuales sin protección.		
Qué hace?	AE previene embarazo después de relaciones sexuales sin protección. AE no termina un embarazo y no sirve si está embarazada.		
Qué contiene?	Cobre	Ulipristal acetate	Levonorgestrel
Nombre comercial	Paragard®	ella®	Plan B® One-Step y otros
Qué tan bien funciona?	El DUI de cobre es muy eficaz. El DIU de cobre disminuye su probabilidad de quedar embarazada en un 99%. No importa cuánto pesa.	AE de ulipristal acetate tiene alta a medio eficacia. Es posible que no funcione bien si es obesa.	Levonorgestrel tiene medio a baja eficacia. Puede que no funcione en absoluto si está sobrepeso.
Cómo funciona?	El DIU de cobre es una varilla de plástico en forma de T que se queda en el útero. Esta envuelto en cobre, que hace los espermatozoides inmóviles. Cuando los espermatozoides no pueden llegar a un óvulo, no puede quedar embarazada.	AE de ulipristal acetate imita y bloquea progesterona. Ulipristal acetate retrasa la ovulación.	Levonorgestrel a es una hormona progesterona, como las que produce su cuerpo. AE de progesterona retrasa la ovulación.
Cuándo se usa?	Se puede insertar el DIU de cobre hasta 5 días después de una relación sexual sin protección para prevenir el embarazo. Funciona como método anticonceptivo por un máximo de 12 años. Se puede hacer sacar el DIU de cobre cuando lo desee.	AE de ulipristal acetate puede funcionar hasta 5 días después de una relación sexual sin protección. Tómelo tan pronto como sea posible después de una relación sexual sin protección.	Cuanto antes tome el AE de progesterona, mejor funciona. Tómelo tan pronto como sea posible después de una relación sexual sin protección. Algunos paquetes contienen 1 pastilla, y algunos contienen 2 pastillas. Debe tomar las dos pastillas juntas.

	<p>DIU de cobre</p> 	<p>Pastillas de Ulipristal Acetate</p> 	<p>Pastillas de Progestina</p> 
<p>Qué ocurre en su cuerpo?</p>	<p>Después de colocar un espéculo en la vagina, un proveedor médico inserta el DIU dentro del útero. Muchos proveedores dan medicina para el dolor antes del procedimiento. Algunas personas tienen calambres y manchado por unas horas después.</p>	<p>La mayoría de personas que usan pastillas de AE se sienten bien. Algunas personas tienen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareo, dolor de estómago, o dolor de pechos un poco después de tomar pastillas de AE.</p> <p>Puede que su próxima regla se adelante o se atrase unos días. Puede quedar embarazada si tiene relaciones sexuales sin protección otra vez.</p>	
<p>Cuánto cuesta?</p>	<p>Si no está cubierto por su seguro, el DIU de cobre puede costar \$500 - \$1,000 dolares.</p> <p>Muchos seguros médicos cubren el DIU de cobre.</p>	<p>AE de ulipristal acetate cuesta \$35 - \$70 por una dosis.</p> <p>Algunos seguros médicos cubren AE de ulipristal acetate.</p>	<p>AE de progestina cuesta \$35 - \$60 por 1 dosis.</p> <p>Algunos seguros médicos cubren AE de progestina.</p> <p>Aunque algunas marcas se venden sin receta médica, es posible que necesite una receta para que lo cubra su seguro médico.</p>
<p>Donde se encuentra?</p>	<p>Un proveedor de salud debe de insertar el DIU de cobre. Llame a su centro de salud para pedir una cita. Dígalos que necesita un DIU tan pronto posible para la anticoncepción de emergencia.</p>	<p>Puede conseguir AE de ulipristal acetate en farmacias, centros de salud, o con personal médico. Llame primero para saber si ellos la tienen.</p> <p>Se necesita una receta para conseguir ulipristal acetate.</p> <p>Pregunte al personal médico que la atiende o visite www.not-2-late.com.</p>	<p>Está disponible en farmacias, centros de salud, o con personal médico. Llame primero para saber si ellos la tienen.</p> <p>Pharmacias venden algunas marcas de AE de progestina sin receta. Se consiguen otras marcas AE de progestina en la farmacia sin receta si eres mayor de 17 años.</p> <p>Pregunte al personal médico que la atiende o visite www.not-2-late.com.</p>