

XXXXXX健康中心

地址

电话：

Nexplanon（孕酮植入剂）带回家表单

- 植入剂在7天后开始发挥避孕作用。
- 植入剂植入后最初7天，您应使用备用避孕措施。
- 植入剂能在您的皮肤下保留5年。
- 取出日期：_____（从今天起5年）。

须知：

- 常见副作用包括：**不规则阴道出血**。您的月经期可能会改变。您可能会出现月经量增加、月经量减少或不来月经等情况，并且您的月经期可能会延长。
- 植入后最初24小时，植入部位出现淤血和肿胀是正常的。请将敷料保持24小时。24小时后，您可以去掉敷料并淋浴或盆浴。
- 您可以用指尖按压植入剂植入部位的皮肤来检查植入剂的存在。您可以感觉到一个小棒样的东西。如果您感觉不到植入剂，请与您的医生联系。

植入完成后您可以回学校或去上班。

植入剂**不能**预防性病(STI)。您可以使用乳胶避孕套和/或口交膜预防性病。大多数女性应每年进行一次性病检测。

警示症状：

在第一周内

- 植入部位红肿、发热或流液
- 发烧（>101华氏度）

任何时间

- 有妊娠反应（乳房疼痛、恶心）
- 早孕试纸测试为阳性

然而，研究表明Implanon从未出现避孕失败 — 其避孕成功率为100%！

如果您出现以上任何警示症状，您应该及时看医生。您可以拨打**XXX-XXX-XXX**联系我们，或者咨询您平时就诊的医生。