

XXXXXX醫療中心

地址

電話：

## Nexplanon ( 孕酮植入劑 ) 攜回用表格

- 植入劑在7天後開始發揮避孕作用。
- 在植入劑植入後最初7天，您應使用備用避孕措施。
- 植入劑能在皮下保留5年。
- 移除日期：\_\_\_\_\_ ( 從今天起5年 ) 。

### 須知：

- 常見副作用包括：**不規則**陰道出血。您的月經期可能會改變。您可能會出現月經量增加、月經量減少或不來月經等情況，並且您的月經期可能會延長。
- 植入後最初24小時，植入位點出現淤血和腫脹是正常的。請將敷料保持24小時。24小時後，您可以去掉敷料並淋浴或盆浴。
- 您可以用指尖按壓植入劑植入部位的皮膚來檢查植入劑的存在。您可以感覺到一個像小棒一樣的東西。如果您感覺不到植入劑，請與您的醫生聯絡。

植入完成後您可以回學校或去上班。

植入劑**不能**防止感染性病(STI)。您可以使用乳膠避孕套和/或口交膜預防STI。大多數女性應每年進行一次STI檢測。

### 警示症狀：

在第一週內

- 植入位點紅腫、發熱或流液
- 發燒 (>華氏101度)

任何時間

- 感覺懷孕了 ( 乳房疼痛、噁心 )
- 早孕試紙測試為陽性

然而，研究顯示Implanon從未出現避孕失敗 — 其避孕成功率為100%！

如果您出現以上任何警示症狀，您應該及時看醫生。您可以撥打 **XXX-XXX-XXX** 聯絡我們，  
或者去您平時就診的醫療機構。