

藥物流產同意書

請在每條聲明前寫下您的名字縮寫，以表明您已理解並同意相關內容。

____我知道，對於本次妊娠我有3種選擇：自己撫養、找人領養和流產。

____「藥物流產」意味著使用藥物進行流產。吸引流產是使用儀器清空子宮。除非我確定我想要終止妊娠我才會開始進行藥物流產。如果藥物流產失敗我願意進行吸引流產。

____流產是我自己的決定，沒有人強迫我這麼做。

____我知道藥物流產必須在妊娠後的最初10週內進行。

____我將服用2種藥物。第一種藥物是Mifepristone（美服培酮），它可以阻止繼續妊娠所需要的荷爾蒙。我的服用劑量為200 mg，因為研究表明該劑量是有效的。第二種藥物是Misoprostol（米索前列醇）。它會導致宮縮，進而排出孕囊。

____我會在診所吞服美服培酮片。

____我會帶4片米索前列醇片回家。我會按照說明使用它們。

____置入米索前列醇後的一至六個小時，我會出現腹痛和出血。嚴重腹痛可能會持續幾個小時，但是通常不會超過24小時。會出現大量出血並伴有血塊，時間會持續幾個小時。我可能會看見一些妊娠組織（通常為白色或灰白色）。如果大量出血持續時間超過12小時，或者在兩小時內每小時的出血量浸透兩片以上衛生棉，我應打電話聯絡我的醫生。如果置入米索前列醇後的24小時內沒有出血，我會打電話聯絡我的醫生。

____如果我感覺很不舒服，我會打電話聯絡醫療中心。極少情況下，女性進行藥物流產後會發生「中毒性休克」類疾病。

____我知道該藥物流產很安全，但是也會有一些罕見的風險，包括感染、繼續妊娠和大量出血。大量出血和感染常常會伴隨繼續妊娠。

____一至兩週內我應去複查，確信已完全流產。

____必須完全流產，因為米索前列醇會導致嚴重的出生缺陷。如果流產不完全，我可能需要透過真空吸引術（一種清空子宮的吸引手術）終止妊娠。

___如果發生併發症，我請求並允許醫生採取一切必要措施保護我的健康和利益。

___我已閱讀該同意書並有時間考慮它。我所有的疑問都已獲得解答。

___如果我已進行性傳播疾病檢測或血型檢測，透過該電話能聯絡我並告知我檢測結果：

我的電話：_____我們是否可以進行私密留言？_____是_____否

___我已閱讀該同意書並有時間考慮它。我所有的疑問都已獲得解答。

___在此，我同意我的醫生_____為我提供早期藥物流產所需的美服培酮和米索前列醇。

患者簽名：_____

日期：_____

醫生簽名：

日期：_____

見證人：_____

日期：_____