

Recuerde, el implante **no le protege contra las Infecciones de Transmisión Sexual o el VIH.**  
¡Siempre use condones para protegerse!



## ¿CÓMO FUNCIONA EL IMPLANTE?

- El implante de progestina es un tubo delgado de plástico del tamaño de un fósforo. Un proveedor de salud lo coloca bajo la piel de su brazo.
- El implante libera progestina, una hormona como las que su cuerpo produce. Este funciona haciendo que el moco en su cuello uterino sea demasiado espeso para que los espermatozoides lo puedan atravesar. Si los espermatozoides no pueden llegar al óvulo, usted no puede quedar embarazada.
- Cada implante dura hasta 5 años.
- Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. El implante es más de 99% efectivo.

## ¿CÓMO DEBO USAR EL IMPLANTE?

- Después de adormecer su piel, un proveedor de salud introduce el implante bajo la piel de su brazo. Esto toma solo unos minutos. Se puede hacer en el consultorio o la clínica.
- Usted no debería ducharse o tomar un baño hasta 24 horas después de que se le haya colocado el implante.
- Usted debería **usar condones como método de respaldo durante los primeros 7 días** después de recibir el implante.

## ¿CÓMO ME AYUDA EL IMPLANTE?

- El implante es un anticonceptivo seguro y eficaz. Una vez que lo tenga, este funciona por sí mismo – usted no tiene que hacer nada.
- Usted puede usar el implante mientras esté amamantando.
- Usted puede usar un implante por 5 años. Si lo desea usar por más tiempo, usted puede obtener un implante nuevo después de 5 años. Si no le gusta o usted decide quedar embarazada, su proveedor de salud puede remover el implante antes de que los 5 años hayan pasado.

## ¿CÓMO ME SENTIRÉ AL USAR EL IMPLANTE?

- El implante causa que sus menstruaciones cambien. **La mayoría** de personas tienen manchado intermitente. El manchado puede durar hasta que se le remueva el implante. Esto es normal.
- Puede tener: cambios de estado de ánimo, aumento de peso, dolor de cabeza, acné, y/o cambios en la piel del brazo.
- La mayoría de efectos secundarios desaparecen cuando se le remueva el implante.

## ¿LA GENTE PUEDE VER EL IMPLANTE EN MI BRAZO?

- La mayoría de implantes no se pueden ver, pero usted lo puede sentir si toca la piel que lo cubre.

## ¿EL IMPLANTE TIENE RIESGOS?

- El implante es muy seguro.
- Si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas **en la primera semana** después de la inserción, vea a su proveedor de salud:
  - Enrojecimiento, calor, o supuración en su brazo
  - Fiebre (más de 101°F)
- Si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas **en cualquier momento** mientras tenga el implante, vea a su proveedor de salud:
  - Sensación de embarazo (dolor en los pechos, náusea)
  - Una prueba casera de embarazo positiva