

# Các phương án phá thai sớm

	<b>Thuốc phá thai: Mifepristone và Misoprostol</b>	<b>Thủ Thuật Phá Thai</b>
<b>Thai kỳ được bao nhiêu tuần thì tôi có thể phá thai?</b>	Tối đa 11 tuần từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt gần nhất.	Tối đa 12 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối.
<b>Điều gì sẽ xảy ra?</b>	<p>Phá thai tại nhà.</p> <p>Hãy uống viên thuốc phá thai đầu tiên (mifepristone) vào thời điểm phù hợp nhất với bạn.</p> <p>Bạn có thể sẽ cảm thấy ổn sau khi uống viên thuốc đầu tiên. Quý vị có thể bị buồn nôn.</p> <p>Sau đó, hãy uống tiếp bốn viên misoprostol.</p> <p>Vài giờ sau khi bạn uống misoprostol, sẽ có hiện tượng chuột rút và chảy máu. Bạn sẽ bị chuột rút và chảy máu nhiều.</p> <p>Bạn không cần phải tái khám định kỳ. Bạn có thể gọi điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp bác sĩ lâm sàng 1-2 tuần sau đó.</p>	<p>Phá thai tại phòng khám.</p> <p>Thủ thuật phá thai thực tế diễn ra từ 5 đến 10 phút.</p> <p>Bác sĩ lâm sàng sẽ đặt dụng cụ vào âm đạo và tử cung của bạn để loại bỏ thai.</p> <p>Bạn không cần phải tái khám định kỳ. Bạn có thể gọi điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp bác sĩ lâm sàng quen thuộc hoặc tại phòng khám nơi bạn đã phá thai 1-2 tuần sau đó.</p>
<b>Mức độ đau như thế nào?</b>	Quý vị có thể bị co thắt bụng với mức độ nặng nhẹ khác nhau, luân phiên từ hơi đau cho đến rất đau trong thời gian phá thai. Thuốc giảm đau có thể giúp ích cho quý vị.	Quý vị có thể bị co thắt bụng với mức độ nặng nhẹ khác nhau, từ hơi đau cho đến rất đau trong thời gian phá thai. Thuốc giảm đau có thể giúp ích cho quý vị.
<b>Tôi sẽ ra máu nhiều đến mức nào?</b>	Quý vị sẽ bị ra máu nhiều có cục máu đông trong thời gian phá thai. Sau đó, quý vị tiếp tục bị ra máu nhẹ hơn trong một vài tuần.	Quý vị có thể bị ra máu nhẹ trong 1-7 ngày. Quý vị tiếp tục bị ra máu trong một vài tuần.
<b>Chi phí phá thai là bao nhiêu?</b>	Chi phí chính xác tùy thuộc vào nơi quý vị sử dụng biện pháp phá thai (đối với cả hai biện pháp).	
<b>Phá thai có thể thất bại không?</b>	Viên thuốc phá thai có tác dụng 98-99%. Nếu viên thuốc phá thai không có tác dụng, quý vị có thể thử dùng lại thuốc hoặc tiến hành thủ thuật phá thai.	Thủ thuật có tác dụng 99%. Nếu thất bại, quý vị phải lặp lại thủ thuật phá thai.
<b>Tôi vẫn có thể có con sau này chứ?</b>	<b>Có.</b> Cả hai biện pháp phá thai này đều không làm giảm cơ hội mang thai hay giữ thai của quý vị trong tương lai.	

## Các phương án phá thai sớm

	<b>Thuốc phá thai: Mifepristone và Misoprostol</b>	<b>Thủ Thuật Phá Thai</b>
<b>Biện pháp này có an toàn không?</b>	Cả hai loại thuốc đều an toàn. Những vấn đề nghiêm trọng rất hiếm khi xảy ra.	Thủ thuật hút thai an toàn. Thực hiện phá thai trong 12 tuần đầu nên rất ít vấn đề xảy ra.
<b>Điều cần biết</b>	<p>Phải mất 1-2 ngày để hoàn thành việc phá thai.</p> <p>Chảy máu có thể rất nhiều và kéo dài hơn so với thủ thuật hút thai.</p> <p>Bạn sẽ không có mũi tiêm, thuốc mê hay dụng cụ nào trong cơ thể.</p> <p>Bạn có thể thực hiện tại nhà thay vì tại phòng khám nên sẽ có cảm giác riêng tư hơn.</p> <p>Bạn có thể ở cùng ai đó hoặc ở một mình.</p> <p>Không thể uống các thuốc này để phá thai khi thai kỳ đã muộn.</p> <p>Chuột rút có thể nghiêm trọng và có thể kéo dài hơn so với thủ thuật phá thai.</p> <p>Thuốc này có thể mang lại cảm giác tự nhiên hơn, giống như sảy thai.</p> <p>Biện pháp này không có tác dụng đình chỉ thai ngoài tử cung hoặc ống dẫn trứng.</p>	<p>Việc phá thai sẽ kết thúc sau vài phút.</p> <p>Chảy máu ít hơn so với phá thai bằng thuốc.</p> <p>Bác sĩ lâm sàng phải đưa dụng cụ vào bên trong tử cung.</p> <p>Bạn có ít quyền kiểm soát hơn đối với thủ thuật phá thai.</p> <p>Bạn có thể không được chọn người đồng hành.</p> <p>Có thể được thực hiện muộn hơn trong thai kỳ so với phá thai bằng thuốc.</p> <p>Thuốc gây mê và thuốc giảm đau có thể gây ra tác dụng phụ.</p> <p>Thiết bị hút có thể ồn ào.</p> <p>Biện pháp này không có tác dụng đình chỉ thai ngoài tử cung hoặc ống dẫn trứng.</p>

Tài nguyên cho Tìm kiếm Dịch vụ Phá thai An toàn: [www.abortionfinder.org](http://www.abortionfinder.org), [www.inedana.com](http://www.inedana.com)