

妊娠失败（流产）治疗知情同意书 使用药物

请在每条陈述前写下您姓名首字母缩写，表明您理解并同意其内容。

___ 我理解本同意书中包含了比 Danco Mifeprex（米非司酮）患者协议较更新的内容。米非司酮可用于终止妊娠或治疗妊娠失败（流产）。我正在使用米非司酮治疗妊娠早期流产。

___ 科学数据显示，为了在妊娠早期流产后清理子宫，将米非司酮与喜克溃共同使用比单独使用喜克溃的效果更好。

___ 我了解应对妊娠早期流产的方法：观察并等待，使用药物（米非司酮和喜克溃）或采用刮宫手术。我选择使用药物。

___ 我会吃两种药物：一种是米非司酮，一种是喜克溃。

___ 首先，我会在办公室或家中服下 200 mg 米非司酮片剂。

___ 服用米非司酮 24 小时后，我会将 4 片 200 mcg 喜克溃塞入我的阴道。我会同时用完这 4 片喜克溃。喜克溃会产生肌肉痉挛和流血，以此方式清理子宫。

___ 痉挛和流血的现象，通常会出现在使用喜克溃后 1-6 小时内。强烈痉挛现象可能会持续几个小时，但通常不会超过 24 小时。大量流血并伴有血块的现象将持续几个小时。我可能会在血液中看到妊娠组织（通常为灰白色物质）。

___ 我知道这种药物治疗很安全。在极少情况下会存在感染和大出血的风险。

___ 如出现以下现象，我会给我的医生打电话：

- 1) 大量出血的时间持续超过 12 小时，或每小时使用的卫生巾超过 2 个，持续 2 小时。
- 2) 我在使用喜克溃后 24 小时内没有出血现象。
- 3) 我出现超过 100.4 华氏度的高烧，或开始感觉非常难受。

___ 我会在 4 - 14 天内联系我的医生，确保药物已经生效。

___ 我理解，这两种药物同时使用会在 84% 的情况下产生效果。如果没有达到预期效果，我可能需要进行刮宫手术清理子宫，或再进行一轮药物治疗。

___ 如果出现并发症，我允许医生采取任何必要措施保护我的健康。

___ 我已阅读这个表格并予以认真考虑。我提出的所有问题都得到了回答。

___ 我已获得 Danco 患者协议，并已阅读和签字。

___ 如果我进行了性传播疾病检测或验血，可通过以下号码告知结果：_____

您可以在电话中留言 ___是 ___否

___ 我特此同意由我的医生_____向我提供米非司酮与喜克溃，用于治疗早期妊娠流产。

患者姓名：_____

患者签字：_____ 日期：_____

医生姓名：_____

医生签字：_____ 日期：_____