

Consentimiento para tratamiento de aborto espontáneo

Usando medicamentos

Escriba sus iniciales antes de cada declaración para demostrar que usted entiende y está de acuerdo con ella.

___ Yo entiendo que la información contenida en este consentimiento es más actualizada que la información en el acuerdo del paciente que pertenece a Danco Mifeprex (mifepristona). La mifepristona se puede usar para interrumpir un embarazo o para tratar una pérdida temprana de embarazo (aborto espontáneo). Yo estoy usando mifepristona para tratar una pérdida temprana de embarazo (aborto espontáneo).

___ Datos científicos muestran que usar mifepristona con misoprostol funciona mejor para vaciar el útero después de una pérdida temprana del embarazo que usar solo misoprostol.

___ Entiendo las opciones para controlar un aborto espontáneo: observar y esperar, usar medicamentos (mifepristona y/o misoprostol) o un procedimiento de succión. Yo elijo usar medicamentos.

___ Tomaré 2 medicamentos: primero mifepristona y el segundo es misoprostol.

___ Primero, tomaré una píldora de 200 mcg de mifepristona, ya sea en la oficina o en casa.

___ Veinticuatro horas después de usar la mifepristona, colocaré cuatro píldoras de 200mcg misoprostol en mi vagina. Usaré las cuatro píldoras de misoprostol al mismo tiempo. El misoprostol causa los calambres y el sangrado que vacían el útero.

___ De una a seis horas después de colocar el misoprostol, tendré calambres y sangrado. Los calambres pueden ser muy fuertes durante varias horas, pero por lo general no duran más de 24 horas. El sangrado puede ser bastante profuso, con coágulos, durante unas horas. Es posible que vea tejido del embarazo (generalmente de color blanco o gris).

___ Yo entiendo que el tratamiento con píldoras es muy seguro. Hay algunos riesgos raros, que incluyen infecciones y sangrado abundante.

___ Me comunicaré con mi proveedor de salud si:

1. El sangrado abundante dura más de 12 horas, o si remojo más de 2 almohadillas máximas cada hora durante 2 horas seguidas.
2. NO sangro dentro de las 24 horas de haber usado el misoprostol.
3. Tengo fiebre más de 100.4 grados o empiezo a sentirme muy enferma.

___ Haré una cita de seguimiento con mi proveedor de salud 4 a 14 días para asegurarme de que los medicamentos funcionaron.

___ Entiendo que estos dos medicamentos funcionan el 84% del tiempo. Si no funcionan, es posible que necesite un procedimiento de succión para vaciar mi útero u usar los medicamentos otra vez.

___ Si ocurre una complicación, le permito a mi médico hacer lo que sea necesario para proteger mi salud.

___ He leído este formulario y he tenido tiempo para pensarlo. Todas mis preguntas han sido respondidas.

___ Me han dado el acuerdo del paciente de Danco para leer y firmar.

___ Si me hicieron pruebas de infecciones de transmisión sexual o de tipo de sangre, estaré disponible en este número para recibir los resultados:

 Mi Teléfono: _____

 Me puede dejar un mensaje confidencial ___si ___no

___ Por este medio doy mi consentimiento que mi proveedor de salud _____ me proporcione la mifepristona y el misoprostol para tratar me aborto espontáneo.

Nombre del paciente: _____

Firma del paciente: _____

Fecha: _____

Nombre del proveedor de salud: _____

Firma del proveedor de salud: _____

Fecha: _____