

ያስታውሱ፡ ዲያፍራም በጾታዊ ግንኙነት ከሚተላለፉ የአባላዘር በሽታዎች ወይም ከኤችአይቪ (HIV) አይከላከልም። እራስዎን ለመጠበቅ በሁሉም ጊዜ ኮንዶም ይጠቀሙ!



ዲያፍራም እንዴት ይሰራል?

- ዲያፍራም የማህፀን በርዎን የሚሸፍን የሲሊኮን ክዳን ነው። ድያፍራም በማህፀንዎ በር አጠገብ ስፐርሚሳይድ (የወንድ ዘርን የሚገድል ጄል ወይም ክሬም) ይይዛል። ያለ ስፐርም (ወንድ ዘር)፤ እርግዝና ሊፈጠርብዎ አይችልም።
- የትኛውም ዓይነት የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴ 100% ውጤታማ አይደለም። ዲያፍራም 83% ውጤታማ ነው።


ዲያፍራምን መቼ ልጠቀም?

- የግብረ ሥጋ ግንኙነት በሚፈጽሙበት በእያንዳንዱ ጊዜ ዲያፍራምን ከስፐርሚሳይድ ጋር ይጠቀሙ።
- የሴት ብልት ኢንፌክሽን ካለብዎ፣ ዲያፍራም አይጠቀሙ። ኢንፌክሽኑ እስኪያልቅ ድረስ ኮንዶም ይጠቀሙ።

ዲያፍራምን እንዴት ልጠቀም?

- ትክክለኛውን መጠን እንዳገኙ ለማረጋገጥ ሐኪምዎ ለ Milex® diaphragm ያመቻችልዎታል። የካያ® ዲያፍራም በአንድ መጠን ብቻ ነው የሚመጣው።
- የግብረ ሰጋ ግንኙነት ከመፈጸምዎ ከስድስት ሰዓታት በፊት ዲያፍራም ወደ ብልትዎ ያስገቡ።
- የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ ከ6-12 ሰዓታት ባለው ጊዜ ውስጥ ዲያፍራምን ያስወግዱ። ዲያፍራምን በውስጥዎ ከ24 ሰዓታት በላይ አያቆዩ።

ዲያፍራምን እንዴት ማስገባት እችላለሁ?



© Prened Parenthood® Federation of America, Inc. ፈቃድ እንደገና የታወቀ። © 2011 PPEA. ውበቱ በህግ የተጠበቀ ነው።

- አንድ የሾርባ ማንኪያ ስፐርሚሳይድ በመሸፈኛው ውስጥ እና በዲያፍራም ጠርዝ አካባቢ ያኑሩ። [ሥዕላዊ መግለጫ- 1]
- አመቺ አካላትን ይፈልጉ፤ ለምሳሌ፡- መተኛት፣ ወንበር ላይ በአንድ እግር መቆም።
- በአንድ እጅዎ ዲያፍራሙን ውስጥ ካለው ስፐርሚሳይድ ጋር አኩል ሁለት ቦታ ይጠፋት። በሌላኛው እጅዎ ብልትዎን ይክፈቱ። [ሥዕላዊ መግለጫ- 2]
- ዲያፍራሙን ወደ ብልትዎ ውስጥ ያስገቡ። በአንድ ጣትዎ በተቻለዎት መጠን ወደ ብልትዎ ውስጥ ይግፋት። ዲያፍራሙ የማህፀንዎን አንገት (የአፍንጫዎን ጫፍ ይመስላል) ሲነካ ሊሰማዎት ይገባል። የማህፀንዎን አንገት ካልተሰማዎት ዲያፍራሙን ያውጡ፤ ተጨማሪ ስፐርሚሳይድ በመሸፈኛው ውስጥ ያድርጉና ዲያፍራሙን እንደገና ያስገቡ። [ሥዕላዊ መግለጫ- 3]
- በ6 ሰዓታት ውስጥ እንደገና የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከፈጸሙ፤ ዲያፍራሙን ውስጥ አንዳለ ይተውት። ተጨማሪ ስፐርሚሳይድ በሴት ብልትዎ ውስጥ በአፕሊኬተር (በመጨመሪያ) ወይም በጣቶችዎ ያኑሩ።

በሌላ በኩል ቀጠለ →



This publication is supported by the Office of Population Affairs (OPA) of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling \$1,361,200. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by OPA/HASH/HHS, or the U.S. Government.

ዲያፍራምን እንዴት ላውጣው?

- በአንድ ጣት የዲያፍራም ጠርዝ ላይ ያሰገቡት እና ያውጡት። በዲያፍራም ውስጥ ቀዳዳ እንዳይፈጥሩ ይጠንቀቁ።
- ዲያፍራሙን በትንሽ ሳሙና እና ውሃ ያጠቡ እና አየር እንዲደርቅ ያድርጉት። በዲያፍራም ውስጥ ምንም ቀዳዳዎች አለመኖራቸውን ያረጋግጡ። ዲያፍራም ቀዳዳ ካለው፣ ሐኪምዎን ያነጋግሩ።

ዲያፍራሙን እንዴት ላስቀምጥ?

- ዲያፍራሙን ከፀሀይ ብርሀን ርቆ በቀዝቃዛ ደረቅ ቦታ ውስጥ በተቀመጠ መያዣ ውስጥ ያድርጉት።

ዲያፍራም ለምን ያህል ጊዜ ያገለግላል?

- የእርስዎን ዲያፍራም ከ1-2 ዓመታት ሊገለገሉበት ይችላሉ።

ዲያፍራምን መጠቀም አቁሜ ጥንቃቄ የሳደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ብፅፅም?

- እርግዝናን ለመከላከል፤ ወዲያውኑ የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ (EC) ይውሰዱ። ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ (EC) ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ እስከ 5 ቀናት ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ እርግዝናን ሊከላከል ይችላል፤ በፍጥነት መውሰድም የተሻለ ውጤታማ እንዲሆን ያደርገዋል።

ዲያፍራም እንዴት ይረዳኛል?

- ለአያያዝ ቀላል ነው።
- የወሲብ እርካታን አይቀንሱም።
- ጡት በሚያጠቡበትም ጊዜ ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

ዲያፍራም ስጠቀም ምን ይሰማኛል?

- በወሲብ ወቅት፤ ብዙ ሰዎች እና አጋሮቻቸው የዲያፍራሙ መኖር አይሰማቸውም።
- አንዳንድ ሰዎች ዲያፍራም ከተጠቀሙ በኋላ የፊኛ ኢንፌክሽን ሊያጋጥማቸው ይችላል።
- አንዳንድ ሰዎች ለዲያፍራም ወይም ለስፐርሚሳይድ አለርጂኮች ርቶቻቸው።

ዲያፍራም ስጋት አለው?

- ዲያፍራሞች አስተማማኝ እና ውጤታማ የወሊድ መከላከያ ናቸው። ከባድ ችግሮች በጣም ጥቂት ናቸው።
- የዲያፍራሞች አጠቃቀም ከስፐርሚሳይድ ጋር አብሮ መሆን ይኖርበታል። ስፐርሚሳይዶች በኤች አይ ቪ የመያዝ እድልን ከፍ ሊያድርግ የሚችል ኬሚካል (nonoxynol-9) ይዘዋል፤ አዘውትሮ መጠቀም ለአደጋ ሊያጋልጥ ይችላል።
- ከሚከተሉት ምልክቶች አንዱ ካለብዎ፣ ሀኪምዎን ያነጋግሩ።
 - በሽንት ወቅት ማቃጠል
 - የሴት ብልት ማሳከክ ወይም ያልተለመደ ፈሳሽ
 - ከፍተኛ ትኩሳት

