

ቋሚ የወሊድ መቆጣጠሪያ (ማምከን)

	<p>የቱባል ዘዴዎች ("ቱባል" ወይም "ቱቦዎችን ማሰር") እነዚህ ዘዴዎች የፋሎፕን ቱቦች (የማህፀን ቱቦ) በመዘጋት ወይም በመቁረጥ እንቁላል ከሰፈረውም እንዲያገናኝ ያደርጋሉ ሃኪሞች ይህን ማድረግ የሚችሉባቸው ጥቂት መንገዶች አሉ።</p>	<p>ቫሌክቶሚ ይህ ዘዴ የወንድ የዘር ፍሬን ከወንድ ብልት ውስጥ እንዲይወጣ ይከላከላል።</p>
<p>እንዴት ነው የሚሰራው?</p>	<p>ሐኪሙ በሆድዎ በኩል ወደ ቱቦዎች ይደርሳል። ከዚያም ማሰሪያ ባንዶች ወይም መቆንጠጫዎች በቱቦው ላይ ይደርጋሉ፣ ወይም የእያንዳንዱ ቱቦ ቁራጭ ይወገዳል።</p>	<p>ይህ ዘዴ የሚሠራው የወንድ የዘር ፍሬን በሚይዘው የዘር ከረጢት ውስጥ ያለውን ገመድ በመቁረጥ ነው።</p>
<p>ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ ይሠራል?</p>	<p>98%፣ እንደ ዘዴው ይለያያል</p>	<p>> 99%</p>
<p>ምን ያህል ያስከፍላል?</p>	<p>በአብዛኛዎቹ የኢንፎርግሽን ሰቅዶች እና በሜዲኬይድ ይሸፈናል (ዕድሜ ከ21 ዓመት በላይ ከሆነ)። ካልተሸፈነ፣ ከ1,500 እስከ 6,000 ዶላር ያስከፍላል።</p>	<p>በአብዛኛዎቹ የኢንፎርግሽን ሰቅዶች እና በሜዲኬይድ ይሸፈናል። በሜዲኬር እይሸፈንም። ካልተሸፈነ፣ ከ350 እስከ 1,000 ዶላር ያስከፍላል።</p>
<p>መታወቅ ያለባቸው ነገሮች</p>	<p>እነዚህ ዘዴዎች እርግዝናን በቋሚነት ይከላከላሉ፣ እርግዝናን በመከላከል ደግሞ በጣም ውጤታማ ናቸው።</p> <p>እንደዚህ ዘዴዎች ከወለዱ በኋላ ወዲያውኑ ሊደረጉ ይችላሉ።</p> <p>ወድያውኑ ይሰራል።</p> <p>ከኤችኤይቪ እና ከሌሎች የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም።</p> <p>አጠቃላይ ማደንዘዣ መጠቀም ካልቻሉ ወይም እንደዚህ የመራቢያ አካላት በሽታዎች ካሉ እነዚህን ዘዴዎች አይጠቀሙ።</p> <p>መቀልበስ ከባድ ነው።</p> <p>ሂደቱ በሆሰፒታል ቀዶ ጥገና ክፍል ውስጥ መደረግ አለበት።</p> <p>አደጋዎች ኢንፎክሽን፣ ደም መፍሰስ፣ ህመም እና የማደንዘዣ አለመስማማትን ያካትታሉ።</p> <p>አልፎ አልፎ፣ እርግዝና ሊከሰት ይችላል። እርግዝናው ከተከሰተም፣ 30% የሚሆነው ኤክቶፒክ (ከማህፀን ውጭ) የመሆን እድል አለው።</p> <p>ከሂደቱ በኋላ ህመም ሊከሰት ይችላል እና ለማገገም እንደ ወይም ሁለት ቀን ያስፈልግታል።</p>	<p>እነዚህ ዘዴዎች እርግዝናን በቋሚነት ይከላከላሉ፣ እርግዝናን በመከላከል ደግሞ በጣም ውጤታማ ናቸው።</p> <p>ከቱባል ሂደቶች የበለጠ ውጤታማ እና በዋጋ ተመጣጣኝ ነው።</p> <p>በሐኪሙ ቢሮ ውስጥ ሊከናወን ይችላል።</p> <p>አጠቃላይ ማደንዘዣ አያስፈልግም።</p> <p>ከኤችኤይቪ እና ከሌሎች የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም።</p> <p>በወንድ ብልትዎ፣ በፕሮስቴትዎ ወይም በዘር ፍሬዎ (እንደ የአባላዘር በሽታ ያለ) ወቅታዊ ኢንፎክሽን ካለብዎ ይህ ዘዴ ለእርስዎ አይሆንም።</p> <p>መቀልበስ ከባድ ነው።</p> <p>ስጋቶች ኢንፎክሽን፣ ህመም እና ደም መፍሰስ ያካትታሉ።</p> <p>ለመሰራት እስከ 3 ወር ድረስ ይወስዳል። የዘር ፍተሻ ምርመራው ምንም እይነት የወንድ የዘር ፍሬ እንደሌለ እስከሚያሳይ ድረስ የመጠባበቅያ ዘዴን ይጠቀሙ።</p> <p>ከሂደቱ በኋላ ህመም ሊከሰት ይችላል እና ለማገገም እንደ ወይም ሁለት ቀን ያስፈልግታል።</p>