














# የወሊድ መቆጣጠሪያ ምርጫዎች

ዘዴ	አጠቃቀም	በደም መፍሰስ ላይ ያለው ተጽእኖ	መታወቅ ያለባቸው ነገሮች	ምን ያህል ውጤታማ ነው?*
<p><b>በመርፌ የሚሰጥ/ዘ ጃት/ ዲፖ-ፕሮቬራ®</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በየ3 ወሩ (በየ13 ሳምንቱ) መርፌ ይወጋሉ</li> <li>• መርፌውን እራስዎ ወይም የህክምና ባለሙያ ሊወጋዎ ይችላሉ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ብዙ ጊዜ የወር አበባ ፍሰት ይቀንሳል</li> <li>• ጠብታ ደም ሊያዩ ወይም የወር አበባ ሊቋረጥ ይችላል</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እንዲ መርፌ እስከ 15 ሳምንታት ድረስ ይሰራል</li> <li>• የግል የሆነ</li> <li>• የማህጸን ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል</li> <li>• የሰውነት ክብደት መጨመር፣ ድብርት፣ የፀጉር ወይም የቆዳ ለውጥ፣ የወሲብ ፍላጎት ለውጥን ሊያስከትል ይችላል</li> <li>• የማህጸን ሽፋን ካንሰር፣ የማህፀን ካንሰር እና የፖሊስቴክ ኦቫሪ ሲንድሮም (PCOS) ስጋትን ሊቀንስ ይችላል</li> <li>• መርፌውን ካቆሙ በኋላ የጎንዮሽ ችግሮች እስከ 6 ወራት ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ</li> </ul>	96%
<p><b>የመፅኅ ቀናት ግንዛቤ</b> ተፈጥሮአዊ የቤተሰብ ምጣኔ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የመፅኅ ቀናትን ይተንብዩ፡ በየቀኑ የሙቀት መጠንን በመውሰድ፣ የሴት ብልትን ፈሳሽ ለውጦችን በመፈተሽ፣ እና/ወይም የወር አበባዎን በመመዘገብ</li> <li>• ከእነዚህ ዘዴዎች ውስጥ ከአንድ በላይ መጠቀም የተሻለ ውጤት ያስገኛል</li> <li>• ማርገዝ በሚቻልባቸው ቀናት የግብረ ሥጋ ግኝቶችን ከመጠቀም ይቆጠቡ ወይም ኮንዶም/ስፐርሚሳይድ ይጠቀሙ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የወር አበባ መደበኛ ካልሆነ በደንብ አይሰራም</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ዋጋው አነስተኛ ነው</li> <li>• እርግዝናን ለመከላከል ወይም ለመፅኅ ስራ ይረዳል</li> <li>• በመፅኅ ቀናት የተለየ ዘዴ ይጠቀሙ</li> <li>• ይህ ዘዴ ብዙ ጥረት ይጠይቃል</li> <li>• የሐኪም ማዘዣ አያስፈልግም</li> </ul>	85%
<p><b>ቆዳ ላይ የሚለጠፍ/ፓች/ ኦርቶ ኤቭራ®</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለሶስት ሳምንታት በሳምንት አንድ ጊዜ አዲስ ፓች ይጠቀሙ</li> <li>• በ4ኛው ሳምንት ምንም ፓች አይጠቀሙ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የወር አበባ የበለጠ መደበኛ እና ያነሰ ህመም እንዲኖረው ሊያደርግ ይችላል</li> <li>• በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ የደም መንጠባጠብን ሊያስከትል ይችላል።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ፓች ማድረግ ካቆሙ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ይችላሉ</li> <li>• በፓች ስር ያለ ቆዳን ሊያስቆጣ ይችላል</li> <li>• ይህ ዘዴ ኤስትሮጅንን ይይዛል - ኤስትሮጅን ከቴስቶስትሮን ጋር ይገናኝ እንደሆነ ግልጽ አይደለም</li> </ul>	93%
<p><b>የሴት የማምከኛ ዘዴ፡ በትቦ ላይ የሚደረጉ ዘዴዎች/Tubal Methods/</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እነዚህ ዘዴዎች የፋሎፕያን ቱቦች በምዝጋት ወይም በመቁረጥ ይከናወናሉ</li> <li>• ሐኪሙ የፋሎፕያን ቱቦች ለመድረስ ሆድዎን መብጣት አለበት</li> </ul>	ምንም	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እነዚህ ዘዴዎች ቋሚ እና በጣም ውጤታማ ናቸው</li> <li>• መቀልበስ ከባድ ነው</li> <li>• አደጋዎቹ ኢንፎክሽን፣ ደም መፍሰስ፣ ህመም እና የማደንዘዣ አለመቀበልን ያካትታሉ</li> </ul>	> 98%





\* የተለመደ አጠቃቀም

ዘዴ	አጠቃቀም	በደም መፍሰስ ላይ ያለው ተጽእኖ	መታወቅ ያለባቸው ነገሮች	ምን ያህል ውጤታማ ነው?*
<p><b>የዎንድ የማምከሻ ዘዴ: ቫሴክቶሚ</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ሐኪም ከዎንድ የዘር ፍሬዎ ላይ ስፐርም የሚወሰዱትን ቱቦዎች ይዘጋቸዋል ወይም ይቆርጣቸዋል</li> </ul>	<p>ምንም</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ይህ ዘዴ ቋሚ እና በጣም ውጤታማ ነው</li> <li>• ከቱባል ዘዴዎች የበለጠ ውጤታማ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተመጣጣኝ ነው</li> <li>• በሐኪሙ ቢሮ ውስጥ ሊከናወን ይችላል</li> <li>• አጠቃላይ ማደንዘዥ እያሰፈልግም</li> <li>• መቀልበስ ከባድ ነው</li> <li>• ስጋቶች እንጨክሽን፣ ህመም እና ደም መፍሰስ ያካትታሉ</li> <li>• ለመሰራት እስከ 3 ወር ድረስ ይወስዳል</li> </ul>	<p>&gt; 99%</p>
<p><b>ከሴት ብልት ማሰወጣት</b> በማሰወጣት</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የዘር ፈሳሽ ከመውጣቱ በፊት የዎንድ ብልትን ከሴት ብልት ያውጡ (ማለትም ከመምጣቱ በፊት)</li> </ul>	<p>ምንም</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ምንም ዋጋ አያሰወጣም</li> <li>• ለአንዳንድ ሰዎች ላይ የወሲብ ደስታን ሊቀንስ ይችላል</li> <li>• ብልት በጊዜ ካልወጣ አይሰራም</li> <li>• የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማቋረጥ አለበት</li> </ul>	<p>80%</p>
<p><b>ቀለበት/ዘ ሪንግ/ አኖቪራ ኦቫሪንግ</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ትንሽ ቀለበት ወደ ብልት ውስጥ ያስገቡ</li> <li>• ወርሃዊ ቀለበት፣ በየወሩ ቀለበት ይቀይሩ</li> <li>• አመታዊ ቀለበት፣ በየአመቱ ቀለበት ይቀይሩ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የወር አበባዎ የበለጠ መደበኛ እና ያነሰ ህመም እንዲኖረው ሊያደርግ ይችላል</li> <li>• በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ የደም መንጠባጠብን ሊያሰከትል ይችላል።</li> <li>• የሴት ብልት ፈሳሽ መጨመር ሊያሰከትል ይችላል።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ሁለት ዓይነት አሉ፡- ወርሃዊ ቀለበት እና ዓመታዊ ቀለበት።</li> <li>• ለሁሉም ሰው መጠኑ አንድ አይነት ነው</li> <li>• የግል የሆነ</li> <li>• ቀለበቱን ማድረግ ካቆሙ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ይችላሉ</li> <li>• ይህ ዘዴ ኤስትሮጅንን ይይዛል - ኤስትሮጅን ከቴስቶስትሮን ጋር ይገናኝ እንደሆነ ግልጽ አይደለም</li> </ul>	<p>93%</p>
<p><b>ተክላ ወይ አምፕላንት</b> ኔክስፕላንት</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የጤና ባለሙያ በላይኛው ክንድዎ ቆዳ ስር ይቀብረዋል</li> <li>• ዘዴውን ማቆም ከፈለጉ ሀኪም ያወጣልዎታል</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• መደበኛ ያልሆነ የደም መፍሰስ እና የደም መንጠባጠብ ሊያሰከትል ይችላል</li> <li>• ከ 1 አመት በኋላ የወር አበባዎ ሊቋረጥ ይችላል</li> <li>• ቁርጠቱ ከጊዜ በኋላ አየተሻሎት ይሄዳል</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (እስከ 5 ዓመታት)</li> <li>• ከወጣ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ይችላሉ</li> <li>• የማጎጸን ሽፋን ካንሰር፣ የማህፀን ካንሰር እና የፖሊስቲክ ኦቫሪ ሲንድሮም (PCOS) ስጋትን ሊቀንስ ይችላል</li> <li>• የሰሜት ለውጦችን ሊያሰከትል ይችላል</li> </ul>	<p>&gt; 99%</p>
<p><b>አዩዲ፣ ሆርሞን ያለው</b> ሊሊታ፣ ሚሬና፣ ሰካይላ እና ሌሎች</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በማህፀን ውስጥ በህክምና ባለሙያ መቀመጥ አለበት</li> <li>• አብዛኛው ጊዜ በሃኪም መውጣት አለበት።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ቁርጠት እየተሻሻለ ይሄዳል</li> <li>• ቀለል ያለ የወር አበባ፣ የደም ጠብታ ወይም የወር አበባ ሊቋረጥ ይችላል</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ሌቮኖርጌስትረል ፕሮጂስትሮን ይጠቀማል</li> <li>• በመረጡት የአዩዲ አይነት የሚወሰን ሆኖ ከ3 እስከ 8 ዓመታት በውስጥ ሊቆይ ይችላል</li> <li>• ከወጣ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ይችላሉ</li> <li>• የማጎጸን ሽፋን ካንሰር፣ የማህፀን ካንሰር እና የፖሊስቲክ ኦቫሪ ሲንድሮም (PCOS) ስጋትን ሊቀንስ ይችላል</li> <li>• አልፎ አልፎ፣ ሀኪሙ በሚቀመጥበት ጊዜ የማህፀን ጉዳት ሊያጋጥም ይችላል</li> </ul>	<p>&gt; 99%</p>

\* የተለመደ አጠቃቀም

ዘዴ	አጠቃቀም	በደም መፍሰስ ላይ ያለው ተጽእኖ	መታወቅ ያለባቸው ነገሮች	ምን ያህል ውጤታማ ነው?*
<p><b>አዳዲስ ኮንዶም</b> ፓራጋርድ®</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በማህፀን ውስጥ በህክምና ባለሙያ መቀመጥ አለበት</li> <li>• ኣብዛኛው ጊዜ በሃኪም መውጣት አለበት።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ቁርጠት እና ከባድ የወር አበባ ሊያስከትል ይችላል</li> <li>• በወር አበባ መካከል የደም መገጠባጠብ ሊያስከትል ይችላል (ቴስቶስትሮን ከወሰዱ ይህ ችግር ላይሆን ይችላል)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• እስከ 12 ዓመታት ያገለግላል</li> <li>• ከወጣ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ይችላሉ</li> <li>• የማሳጸን ሽፋን ካንሰር፣ የማህፀን ካንሰር እና የፖሊሲቴክ ኦቫሪ ሲንድሮም (PCOS) ስጋትን ሊቀንስ ይችላል</li> <li>• አልፎ አልፎ፣ ሀኪሙ በሚቀመጥበት ጊዜ የማህፀን ጉዳት ሊያጋጥም ይችላል</li> </ul>	<p>&gt; 99%</p>
<p><b>ክኒን</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ክኒኑን በየቀኑ ይውሰዱ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለብዙ ወራት የሚቆይ የደም መገጠባጠብ ሊያጋጥም ይችላል</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የPMS ምልክቶችን ሊያሻሽል ይችላል</li> <li>• ብጉርን ሊያሻሽል ይችላል</li> <li>• የማህፀን እንቁላል ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል</li> <li>• ይህ ዘዴ ኤስትሮጅንን ይይዛል - ኤስትሮጅን ከቴስቶስትሮን ጋር ይገናኝ እንደሆነ ግልጽ አይደለም</li> <li>• ክኒኑ መውሰድ ካቆሙ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ይችላሉ</li> <li>• ማቅለሽለሽ፣ ክብደት መጨመር፣ ራስ ምታት፣ የወሲብ ፍላጎት መቀየር ሊያስከትል ይችላል - እንዲያውም ወደ ሌላ አይነት ክኒን በመቀየር መፍትሄ ያገኛሉ</li> </ul>	<p>93%</p>
<p><b>የሴት ኮንዶም</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የግብረ ሥጋ ግንኙነት በፈፀሙ ቁጥር አዲስ ኮንዶም ይጠቀሙ</li> <li>• እንደ አስፈላጊነቱ ተጨማሪ ቅባት ይጠቀሙ</li> </ul>	<p>ምንም</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የወሲብ ጨዋታ/የቅድመ-ወሲብ ጨዋታ አካል አድርጎ መጠቀም ይቻላል</li> <li>• በፊንጢጣ እና በሴት ብልት የግብረ ሥጋ ግንኙነት መጠቀም ይቻላል</li> <li>• በሴት ብልት/ፊንጢጣ ደስታን ይጨምራል</li> <li>• የሌቴክስ አለርጂ ላለባቸው ሰዎች ጥሩ ነው</li> <li>• ከኤችአይቪ እና ከሌሎች የአባላዘር በሽታዎች ይከላከላል</li> <li>• የወንድ ብልት ስሜትን ይቀንሳል</li> <li>• ድምጹ ሊረብሽ ይችላል</li> <li>• ለማሰገባት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል</li> <li>• በወሲብ ወቅት ተንሸራቶ ሊወልቅ ይችላል</li> <li>• ከጤና አቅራቢ የሐኪም ማዘዣ አይፈልግም</li> </ul>	<p>79%</p>
<p><b>የወንድ ኮንዶም</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የግብረ ሥጋ ግንኙነት በፈፀሙ ቁጥር አዲስ ኮንዶም ይጠቀሙ</li> <li>• ለላቴክስ አለርጂ ካላብዎት የፖሊዩሪቴን ኮንዶም ይጠቀሙ።</li> </ul>	<p>ምንም</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በብዙ ሰዎች መግዛት ይቻላል</li> <li>• የወሲብ ጨዋታ/የቅድመ-ወሲብ ጨዋታ አካል አድርጎ መጠቀም ይቻላል</li> <li>• የዘር ፈሳሽ ቶሎ መፍሰስን ለመከላከል ይረዳል</li> <li>• በአፍ፣ በሴት ብልት እና በፊንጢጣ የግብረ ሥጋ ግንኙነት መጠቀም ይቻላል</li> <li>• ከኤችአይቪ እና ከሌሎች የአባላዘር በሽታዎች ይከላከላል</li> <li>• የወንድ ብልት ስሜትን ይቀንሳል</li> <li>• የብልት አለመቆምን ሊያስከትል ይችላል</li> <li>• ሊቀደድ ወይም ተንሸራቶ ሊወልቅ ይችላል</li> <li>• የሐኪም ማዘዣ አያስፈልግም</li> </ul>	<p>87%</p>
<p><b>ዲያፍራም</b> ካያ® እና ሚሌክስ®</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የግብረ ሥጋ ግንኙነት በፈፀሙ ቁጥር የሴት ብልት ውስጥ የሚቀመጥ</li> <li>• በእያንዳንዱ ጊዜ የዘር ፍሬን ከሚያጨነግፍ ቅባት ጋር ይጠቀሙ</li> </ul>	<p>ምንም</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለብዙ አመታት ሊቆይ ይችላል</li> <li>• በእነሰተኛ ክፍያ መጠቀም ይቻላል</li> <li>• ከእንዳንድ ኢንፌክሽኖች ሊከላከል ይችላል፣ ነገር ግን ኤችአይቪን አይከላከልም</li> <li>• ስፐርሚሳይድ (የወንድ ዘር ገዳይ) መጠቀም ለኤችአይቪ የመጋለጥ እድልን ይጨምራል</li> <li>• ከሴት ብልት ደም መፍሰስ ወይም ኢንፌክሽን በሚኖር ጊዜ አይጠቀሙ</li> <li>• በሽንት ፊኛ ኢንፌክሽን የመያዝ እድልን ይጨምራል</li> </ul>	<p>83%</p>

\* የተለመደ አጠቃቀም

ዘዴ	አጠቃቀም	በደም መፍሰስ ላይ ያለው ተጽእኖ	መታወቅ ያለባቸው ነገሮች	ምን ያህል ውጤታማ ነው?*
<p><b>ለድንገተኛ እርግዘና መከላከያ ክሊናች</b>            ፕሮጄስቲቭ EC (አቅድ B® ዋን ስቴፕ እና ሌሎች) እና ዩሊፕሪስታል ኦስቴት (ኤላ®)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጥንቃቄ ካልተደረገበት የግብረ ሥጋ ግንኙነት በኋላ ቶሎ ሲወሰዱት በተሻለ ሁኔታ ይሰራል</li> <li>• EC ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ ባሉት እስከ 5 ቀናት ድረስ መጠቀም ይቻላል</li> <li>• ማሸጊያው 2 እንክብሎችን ከያዘ፣ ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ይውሰዱ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የሚቀጥለው የወር አበባዎ ቀደም ብሎ ወይም ዘግይቶ ሊመጣ ይችላል</li> <li>• እጅግ አነስተኛ የደም መፍሰስ ሊያስከትል ይችላል</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በፋርማሲዎች፣ በጤና ጣቢያዎች፣ ወይም በጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ይገኛል፡ መኖሩን ለማረጋገጥ አስቀድመው ይደውሉ</li> <li>• በማንኛውም እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች ያለ ማዘዣ ፕሮጄስቲቭ EC ሊያገኙ ይችላሉ</li> <li>• የሆድ ድርቀት ወይም ማቅለሽለሽ ሊያስከትል ይችላል</li> <li>• ፕሮጄስቲቭ EC ከቴስቶስትሮን ጋር መስተጋብር የለውም፣ ነገር ግን ዩሊፕሪስታል ኦስቴት EC መስተጋብር አንዳለው እና እንደሌለው አናውቅም</li> <li>• ዩሊፕሪስታል ኦስቴት EC የሐኪም ማዘዣ ያስፈልገዋል</li> <li>• ብዙ ወጪ ሊጠይቅ ይችላል</li> <li>• የሰውነትዎ ክብደት መረጃ ጠቋሚ (BMI) ከ26 በላይ ከሆነ ዩሊፕሪስታል ኦስቴት EC ከፕሮጄስቲቭ EC የተሻለ ይሰራል።</li> <li>• ዩሊፕሪስታል ኦስቴት EC ከወሲብ በኋላ ከ3-5 ቀናት ቢወሰድ ከፕሮጄስቲቭ EC የተሻለ ይሰራል</li> </ul>	58 - 94%
<p><b>የሴትን ብልት አሲዳማ የሚያደርግ ጀል ፌክሲ®</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የግብረ ሥጋ ግንኙነት በፈፀሙ ቁጥር የሴት ብልት ውስጥ ጄል ያስቀምጡ</li> </ul>	ምንም	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የወሲብ ጨዋታ/የቅድመ-ወሲብ ጨዋታ አካል አድርጎ መጠቀም ይቻላል</li> <li>• ምንም አይነት ሆርሞኖች የሉትም</li> <li>• የሐኪም ማዘዣ ያስፈልገዋል</li> <li>• የሴት ብልትን፣ የወንድ ብልትን፣ ሊለበልብ ይችላል</li> <li>• የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ሲኖር ጥቅም ላይ አይውልም</li> </ul>	86%
<p><b>የወንድ ዘር ገዳይ በሴት ብልት ውስጥ (ቨጂይናል ስፐርምሳይድ)</b>            ክሬም፣ ጄል፣ ስፖንጅ፣ አረፋ፣ ወደ ብልት የሚገባ፣ ፊልም</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የግብረ ሥጋ ግንኙነት በፈፀሙ ቁጥር ስፐርምሳይድን ያስገቡ</li> </ul>	ምንም	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በብዙ ሰቆች መግዛት ይቻላል</li> <li>• የወሲብ ጨዋታ/የቅድመ-ወሲብ ጨዋታ አካል አድርጎ መጠቀም ይቻላል</li> <li>• በብዙ መልክ ይመጣል፡ ክሬም፣ ጄል፣ ስፖንጅ፣ አረፋ፣ ወደ ብልት የሚገባ፣ ፊልም</li> <li>• ለኤችአይቪ የመጋለጥ እድልን ሊጨምር ይችላል</li> <li>• የሴት ብልትን፣ የወንድ ብልትን፣ ሊለበልብ ይችላል</li> <li>• ክሬም፣ ጄል እና አረፋ የተዘረከረከ ሊሆን ይችላል</li> <li>• የሐኪም ማዘዣ አያስፈልግም</li> </ul>	79%
<p><b>ፕሮጄስቲቭ ክሊናችን ብቻ</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ክሊናችን በየቀኑ ይውሰዱ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የወር አበባዎ የበለጠ መደበኛ እና ያነሰ ህመም እንዲኖረው ሊያደርግ ይችላል</li> <li>• በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ የደም መንጠባጠብን ሊያስከትል ይችላል።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ክሊናች መውሰድ ካቆሙ በኋላ ወዲያውኑ ማርገዝ ይችላሉ</li> <li>• የማሳጸን ሽፋን ካንሰር፣ የማህፀን ካንሰር እና የፖሊስቴክ ኦቫሪ ሲንድሮም (PCOS) ስጋትን ሊቀንስ ይችላል</li> <li>• የመንፈስ ጭንቀት፣ የፀጉር ወይም የቆዳ ለውጥ፣ የወሲብ ፍላጎት መቀየርን ሊያስከትል ይችላል</li> </ul>	93%

\* የተለመደ አጠቃቀም