

# 墮胎藥比較

	美服培酮 (Mifepristone) 和米索前列醇 (Misoprostol)	單獨米索前列醇
我可以懷孕多久？	從上一次月經的第一天算起， <b>最長 11 週</b> 。	從上一次月經的第一天算起， <b>最長 12 週</b> 。
我該如何服藥？	<ul style="list-style-type: none"> <li>在最適合您的時候服用第一片墮胎藥（美服培酮）。服用第一粒藥後，您可能會感到有些噁心。</li> <li>6-72 小時後，您放入 4 粒米索前列醇藥丸。</li> </ul> <p>如果您懷孕 9-11 週，您需要重複服用米索前列醇：4 小時後插入 4 顆藥片。</p>	每 3 小時服用 4 顆米索前列醇藥片，連續 3 次，總共 12 顆。
如何插入米索前列醇？	您將米索前列醇藥丸放入臉頰、舌下或陰道內。30 分鐘後，您吞下或丟棄剩餘的藥片。	
會發生什麼事？	<p>您可能會出現稀便、發燒或發冷。</p> <p>服用米非司酮後，您可能會或可能不會出現一些出血。塞入米索前列醇幾小時後會開始痙攣和出血。您會出現嚴重出血和痙攣幾個小時。</p>	<p>您可能會出現稀便、發燒或發冷。</p> <p>塞入米索前列醇幾小時後會開始痙攣和出血。第一劑、第二劑或第三劑後可能會出現大量出血。您會出現嚴重出血和痙攣幾個小時。</p>
我怎麼知道它是否有效？	<p>你有痙攣和出血的情況。</p> <p>四周後，您的懷孕檢驗結果呈現陰性。</p> <p>您不再感覺懷孕了。</p>	
有什麼不正常？	<p>若出現以下情況，請聯絡臨床醫師：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 你沒有流血。（這可能意味著藥丸不起作用。）</li> <li>- 服用米非司酮後不到 30 分鐘就嘔吐了。</li> <li>- 服用米索前列醇超過 24 小時後發燒 100.4 或更高。</li> <li>- 您有嚴重的腹痛，但服用止痛藥後仍無法緩解。</li> <li>- 你仍然感覺自己懷孕了。</li> </ul>	

\*超過 12 週，請諮詢臨床醫生或撥打 M+A 熱線 (1-833-246-2632)

# 墮胎藥比較

	美服培酮 (Mifepristone) 和米索前列醇 (Misoprostol)	單獨米索前列醇
<b>我什麼時候需要更多藥物</b>	若有以下情況，臨床醫師可能會建議額外劑量的米索前列醇： <ul style="list-style-type: none"><li>- 你沒有流血。</li><li>- 你的出血已經一個多月了。</li></ul>	
<b>會有多痛苦？</b>	這因人而異。在流產期間，您可能會時斷時續地出現輕微至非常強烈的痙攣。布洛芬和萘普生等止痛藥有幫助。	
<b>我會流多少血？</b>	預計數小時內會出現大量血塊並伴隨血塊。之後，您可能會在幾週內斷斷續續地出現少量出血。	
<b>藥丸要多少錢？</b>	成本各不相同。診所墮胎的平均費用為 400-600 美元。遠距醫療墮胎的平均費用為 150 美元以上。 米索前列醇藥丸的價格低於米非司酮。	
<b>這些藥片安全嗎？</b>	兩種藥都很安全。很少會出現大問題。  如果您有以下情況，這些藥物可能對您不安全： <ul style="list-style-type: none"><li>- 懷有子宮內避孕器</li><li>- 正在服用藥物來稀釋血液</li><li>- 有子宮外孕的跡象，例如下腹部一側劇烈疼痛</li></ul>	
<b>藥丸會失效嗎？</b>	這些藥丸在 98-99% 的時間內有效。如果藥物失敗，您可以再次嘗試藥物或進行墮胎手術。	這些藥丸在 80-95% 的情況下有效。如果藥物失敗，您可以再次嘗試藥物或進行墮胎手術。
<b>以後還能要孩子嗎？</b>	是的。墮胎藥對以後的懷孕沒有影響。您可以立即再次懷孕。	
<b>我在哪裡可以獲得有關如何獲取和使用這些藥丸的更多詳細資訊？</b>	<a href="#">如何使用墮胎藥情況說明書</a> <a href="#">如何僅使用米索前列醇進行藥物流產</a> <a href="#">Plan C 墮胎藥指南</a> <a href="https://abortionpillinfo.org/">https://abortionpillinfo.org/</a> <a href="#">併購熱線</a>	
<b>我可以從哪裡獲得更多幫助？</b>	<a href="#">如果/何時/如何：生育法律熱線</a> <a href="#">數位防禦基金</a>	