

Comparación de Pastillas Abortivas

	Mifepristona y Misoprostol	Misoprostol Solo
¿Cuántas semanas de embarazo puedo estar?	Hasta 11 semanas desde el primer día de su último período.	Hasta 12 semanas desde el primer día de su último período.*
¿Cómo tomo las pastillas?	<ul style="list-style-type: none"> Tome la pastilla de mifepristona a una hora conveniente. Puede tener un poco de náusea después de la primera pastilla. Después de 6-72 horas, coloque las 4 pastillas de misoprostol. <p><i>Si su embarazo es 9-11 semanas, tiene que repetir el misoprostol: coloque 4 pastillas más 4 horas más tarde.</i></p>	Puede seguirse poniendo 4 pastillas de misoprostol cada 3 horas, 3 veces seguidas, para una cantidad de 12 pastillas en total.
¿Cómo coloco las pastillas de misoprostol?	Coloque las pastillas de misoprostol dentro de sus mejillas, debajo de su lengua, o dentro de su vagina. Trague o bote lo que queda de las pastillas después de 30 minutos.	
¿Qué puede pasar después de tomar los medicamentos?	<p>Es posible que tenga heces líquidas, como diarrea, fiebre, o escalofríos.</p> <p>Puede que sangre después de tomar mifepristona, pero también puede que no sangre. La mayoría de los calambres y el sangrado empiezan algunas horas después de colocar el misoprostol. Tendrá sangrando abundante y calambres por algunas horas.</p>	<p>Es posible que tenga heces líquidas, como diarrea, fiebre, o escalofríos.</p> <p>Puede que sangre después de tomar mifepristona, pero también puede que no sangre. La mayoría de los calambres y el sangrado empiezan algunas horas después de colocar el misoprostol. Tendrá sangrando abundante y calambres por algunas horas.</p>
¿Cómo sé si funcionó?	<p>Si ha tenido calambres y sangrado.</p> <p>Si tiene una prueba de embarazo negativa 4 semanas después.</p> <p>Si ya no se siente embarazada.</p>	
¿Lo que no es normal?	<p>Llame a su proveedor de salud si:</p> <ul style="list-style-type: none"> No tiene sangrado. (Puede ser que las pastillas hayan funcionado.) Vomitó en menos de 30 minutos después de tomar mifepristona. Tiene una fiebre de 100.4 °F/38 °C o más alta, más de 24 horas después de tomar misoprostol. Tiene dolor de barriga severo que no se le quita con medicamentos para el dolor. Se sienta como si estuviera embarazada todavía. 	

*Después de 12 semanas, hable con un proveedor de salud o [Línea Directa M+ A \(1-833-246-2632\)](tel:1-833-246-2632)

Comparación de Pastillas Abortivas

	Mifepristona y Misoprostol	Misoprostol Solo
¿Cuándo podría necesitar más medicamentos?	Es posible que un proveedor de salud sugiera una dosis adicional de misoprostol si: <ul style="list-style-type: none"> - No tuvo sangrado. - Ha tenido sangrado por más de un mes. 	
¿Qué tan doloroso es?	Esto cambia mucho de persona a persona. Puede ser que tenga calambres de leves o muy fuertes de vez en cuando durante el aborto. Las pastillas para el dolor como ibuprofeno y naproxeno ayudan.	
¿Cuánto voy a sangrar?	Puede tener sangrado abundante con coágulos por algunas horas. Después, puede que disminuya el sangrado y se vuelva hasta por algunas semanas.	
¿Cuánto cuestan las pastillas?	El costo varía. \$400-600 es el costo promedio de un aborto en una clínica. \$150+ es el costo promedio de un aborto por telesalud. Las pastillas de misoprostol cuestan menos que las de mifepristona.	
¿Son seguras las pastillas?	Las pastillas son seguras. Problemas serios son raros. Puede ser que las pastillas no sean seguras para usted si: <ul style="list-style-type: none"> - Está embarazada con DIU - Está tomando medicamentos que diluyan su sangre (por ejemplo: anticoagulantes como warfarin, heparin or eliquis) - Está teniendo señales de un embarazo ectópico, como dolor agudo en un lado de la parte baja de su barriga 	
¿Podrían fallar las pastillas?	Las pastillas funcionan el 98-99% del tiempo. Si las pastillas no funcionan, puede intentar las pastillas otra vez o tener un procedimiento de aborto.	Estas pastillas funcionan el 80-95% del tiempo. Si las pastillas no funcionan, puede intentar las pastillas otra vez o tener un procedimiento de aborto.
¿Podría tener hijos después?	Sí. Las pastillas de aborto no tienen ningún efecto en futuros embarazos. Puede volver a quedarse embarazada inmediatamente.	
¿Dónde puedo conseguir más detalles sobre cómo obtener y usar las pastillas?	<p><u>Como Usar las Pastillas de Aborto</u></p> <p><u>Como Usar Misoprostol Solo para un Aborto con Medicamentos</u></p> <p><u>La Guía Sobre Las Pastillas Abortivas de Plan C</u></p> <p><u>https://abortionpillinfo.org/es/</u></p> <p><u>Línea Directa M+ A</u></p>	
¿Dónde puedo conseguir más ayuda?	<p><u>Si/Cuándo/Cómo: Repro Legal Helpline</u></p> <p><u>Digital Defense Fund: Privacidad del Aborto</u></p>	