

# Opciones que sólo contienen Progesterina

Sin Estrógeno / Se pueden usar si esta amamantando

	<b>DIU con hormonas</b> 	<b>Implante Anticonceptivo</b> 	<b>Inyección</b> 	<b>Pastillas Anticonceptivas de Progesterina Sola</b> 
<b>Marcas</b>	Mirena®, Skyla®, Liletta®, Kyleena®	Nexplanon®	Depo-Provera®	Camila®, Nor-QD®, u otros
<b>¿Qué tan bien funciona?</b>	> 99%	> 99%	96%	93%
<b>¿Dónde puedo conseguirlo?</b>	Un proveedor de salud coloca el DIU en el útero. Por lo general, el proveedor de salud lo remueve.	Después de adormecer su piel, un proveedor de salud introduce el implante bajo la piel de su brazo. Un proveedor de salud tiene que retirarlo.	Tiene que inyectarse cada 3 meses (11-15 semanas). Puede obtener la inyección en una oficina médica o puede inyectarse usted mismo.	Un proveedor de salud manda una receta a la farmacia. Opill® es la única marca disponible sin receta en tiendas o en línea.
<b>¿Cómo usarlo?</b>	Cuando el DIU este colocado, no necesita hacer nada.	Cuando el implante este colocado, no necesita hacer nada.	Repita la inyección cada 3 meses (11-15 semanas)	Tome una pastilla todos los días.
<b>El impacto en el sangrado</b>	Puede mejorar los calambres menstruales. Puede reducir el sangrado mensual. Puede dejar de menstruar.	Puede causar sangrado frecuente y irregular y manchado entre los periodos. Puede sangrar más, menos, o no sangrar. Puede mejorar los calambres menstruales.	Usualmente, reduce el sangrado mensual. Puede causar sangrado irregular, manchado entre los periodos, o un periodo ausente. Puede tener sangrado irregular hasta un año después de su última inyección.	Puede aliviar el dolor del sangrado mensual y hacerlo más regular. Puede causar manchado entre los periodos durante los primeros meses.

continuado en el otro lado →

# Opciones que sólo contienen Progesterina

Sin Estrógeno / Se pueden usar si esta amamantando

	<b>DIU con hormonas</b>	<b>Implante Anticonceptivo</b>	<b>Inyección</b>	<b>Pastillas Anticonceptivas de Progesterina Sola</b>
				
<b>Datos importantes</b>	<p>Puede durar hasta 3 a 8 años, dependiendo del DIU que elija.</p> <p>Puede embarazarse inmediatamente después de que se lo retire.</p> <p>Puede disminuir el riesgo de contraer el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario.</p> <p>Raras veces, se daña el útero durante la inserción.</p>	<p>Puede durar hasta 3-5 años</p> <p>Puede embarazarse inmediatamente después de que se lo retira.</p> <p>Puede disminuir el riesgo de contraer el cáncer de endometrio y el cáncer ovario.</p>	<p>Cada inyección dura 3 meses (11-15 semanas).</p> <p>La inyección es privada para los usuarios.</p> <p>Ayuda prevenir el cáncer del útero.</p> <p>Puede causar el aumento de peso, cambios en el cabello o en la piel, y cambios en el deseo sexual.</p> <p>Puede disminuir el riesgo de contraer el cáncer de endometrio y el cáncer ovario.</p> <p>Los efectos secundarios pueden durar hasta algunos meses después de la última inyección.</p>	<p>La posibilidad de embarazarse es inmediata una vez que deja de tomarlas.</p> <p>Puede disminuir el riesgo de contraer el cáncer del endometrio y el cáncer ovario.</p> <p>Puede causar cambios en el cabello o en la piel, y cambios en el deseo sexual.</p>

