

# Anticoncepción de emergencia y la pastilla abortiva: ¿Cuál es la diferencia?



## La Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (AE)

## La Pastilla Abortiva

<b>¿Qué hace?</b>	Previene un embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección.	Termina un embarazo.
<b>Nombres o marcas de las pastillas</b>	Levonorgestrel (Plan B One-Step®, Next Choice®, y otras) o Acetato de Ulipristal (AUP; ella®)	Mifepristona (Mifeprex®) y Misoprostol (Cytotec®)
<b>¿Qué contienen las pastillas? ¿Cómo funcionan?</b>	La mayoría de las pastillas AE contiene la hormona llamada progestina, similar a la que su cuerpo produce. Progestina es una de las hormonas que se encuentra en las pastillas anticonceptivas diarias. AUP contiene una hormona que imita y bloquea la progestina. Cuando toma estas pastillas, impiden que los ovarios liberen óvulos.	<i>Mifepristona</i> detiene el crecimiento de un embarazo. <i>Misoprostol</i> provoca calambres por lo que el embarazo se sale del útero.
<b>¿Cuándo se toman?</b>	Puede tomar las pastillas AE hasta 5 días (120 horas) después de tener relaciones sexuales sin protección. Cuanto antes tome las pastillas AE, mejor funcionarán. Algunos paquetes contienen 1 pastilla, otros contienen 2 pastillas. Se puede tomar ambas al mismo tiempo.	Funciona al inicio del embarazo, hasta 12 semanas después de su última menstruación. Tome la mifepristona primero, y después el misoprostol. Si no puede conseguir mifepristona, puede tomar misoprostol solamente.
<b>¿Cómo me siento después de tomar las pastillas?</b>	La mayoría de gente se siente bien. Puede sentir náusea, vómito, dolor de cabeza, mareos, dolor abdominal, o dolor en los pechos durante 1-2 días después de tomar las pastillas. Puede que su próxima menstruación se adelante o se atrase unos días.	Después de tomar la primera pastilla, la mayoría de gente se siente bien. Después de tomar las siguientes pastillas, tendrá sangrando abundante, a menudo con coágulos. Esto durará dos o tres horas. Después, sangrado ligero puede durar 1-3 semanas. El dolor puede variar entre calambres ligeros a muy fuertes. Ayuda tomar medicamentos para el dolor.
<b>¿Qué tan bien funciona?</b>	Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Cuanto antes tome las pastillas AE, mejor funcionarán.	Las pastillas abortivas funcionan 98-99% del tiempo. Si no funcionan, puede intentar las pastillas de nuevo o tener un procedimiento de aborto.
<b>¿Cuánto cuesta?</b>	Las pastillas AE cuesta entre \$7-\$70 por un paquete.	El costo exacto depende de dónde vaya.
<b>Cobertura del seguro</b>	Puede usar su seguro de Medicaid o seguro privado con una receta médica. Puede llamar a su compañía de seguro para ver cuales marcas de AE cubren.	Algunos planes de seguro cubren la pastilla abortiva.
<b>¿Dónde las encuentro?</b>	Están disponible en farmacias, centros de salud, o con su proveedor de salud. Llama antes para ver si las tienen. También, puede encontrar las pastillas AE de progestina de máquinas expendedoras o a través de plataformas de telesalud. Puede conseguir AE de progestina sin receta sin importar su edad. Necesita una receta medica para AUP.	Pregúntele su proveedor de salud o visite: <a href="https://www.ineedana.com/es">https://www.ineedana.com/es</a> <a href="https://es.plancpills.org/">https://es.plancpills.org/</a>

\*Después de 12 semanas, hable con un proveedor de salud o [Línea Directa M+ A \(1-833-246-2632\)](tel:18332462632)