


























Tus opciones anticonceptivas











Leyenda:












-  No necesita receta médica
-  Protege contra VIH/ITS
-  Tiene hormonas
-  No tiene hormonas



Método	Cómo usarlo	¿Cambia el sangrado mensual?	Cosas que debes saber	¿Qué tan bien funciona?
Anillo vaginal ANNOVERA® NuvaRing®  	Coloca el anillo en la vagina. El anillo mensual (Nuvaring®): Cámbialo cada mes. Deja el anillo en la vagina por 3 semanas (21 días). Después, sácalo por 1 semana (7 días). El anillo anual (ANNOVERA®): Cámbialo cada año.	Puede hacer el sangrado mensual más regular, ligero, y corto. Puede causar manchas de sangre. Puede mejorar los cólicos menstruales.	<ul style="list-style-type: none"> • Hay dos tipos de anillos: un anillo mensual y un anillo anual. • Necesitas receta médica. • Talla única. • Puede ayudar con el acné. • Puede causar náusea y/o dolor en los pechos. • Puede deslizarse durante el sexo o al ir al baño. • Guarde Nuvaring® en el refrigerador. • Después de dejar de usar el anillo, puedes quedar embarazada inmediatamente. • Contiene las hormonas estrógeno y progestina. 	7 de cada 100 personas quedan embarazadas.
Condón externo    	Coloca un condón nuevo cuando el pene esté erecto. Usa un condón nuevo cada vez que tengas sexo. Usa un condón sin látex si eres alérgico al látex.	No	<ul style="list-style-type: none"> • Puedes comprarlo en muchas tiendas o obtenerlo gratis en un centro de salud o clínica. • Puedes ponerlo como parte del juego previo • Puede ayudar a que el sexo dure más tiempo. • Se puede usar para sexo oral, vaginal, y anal • Puede disminuir la sensibilidad del pene durante sexo. • Puede romperse o deslizarse. 	13 de cada 100 personas quedan embarazadas.
Condón interno FC2®   	Aprieta los bordes del anillo interior y empújalo dentro de la vagina. Mantén el anillo externo fuera de la vagina y sosténlo cuando el pene entre. Coloca un condón nuevo cada vez que tengas sexo. Use lubricación según lo necesite.	No	<ul style="list-style-type: none"> • Puedes obtenerlo por internet con una receta médica. • Es posible obtenerlo sin receta médica en un centro de salud o clínica. • Puedes ponerlo como parte del juego previo. • Se puede usar para el sexo anal y vaginal. • Puede aumentar el placer vaginal/anal y disminuir la sensibilidad del pene durante el sexo. • No tiene látex. • Tu y tu pareja pueden sentirlo durante el sexo. • Puede ser difícil de colocar. • Puede deslizarse durante el sexo. • No lo uses con un condón externo. 	21 de cada 100 personas quedan embarazadas.
Diafragma Caya® y Milex®  	Coloca la copa de silicona en la vagina cada vez que tengas sexo. Déjalo puesto por 6 horas después del sexo. La copa mantiene el espermicida cerca del cuello del útero y bloquea que los espermatozoides lleguen al óvulo. Siempre úsalo con espermicida.	No	<ul style="list-style-type: none"> • Dura hasta 2 años. • Necesitas receta médica. • Caya® viene en talla única. Un proveedor de salud te ajusta el Milex® para darte la talla correcta. • No lo uses si tienes una infección vaginal. • Puede causar irritación o infecciones urinarias o en la vagina o vejiga. • El espermicida puede aumentar el riesgo de VIH. 	17 de cada 100 personas quedan embarazadas.

Método	Cómo usarlo	¿Cambia el sangrado mensual?	Cosas que debes saber	¿Qué tan bien funciona?
<p>DIU con hormonas Liletta®, Mirena®, Skyla®, y otras</p>  	<p>Este pequeño dispositivo en forma de T es colocado en el útero por un proveedor de salud.</p> <p>Una vez que lo tienes, no tienes que hacer nada para que funcione.</p> <p>Por lo general, un proveedor de salud lo retira.</p>	<p>Puede hacer el sangrado más ligero, manchas de sangre, o ausencia de sangrado mensual.</p> <p>Puede mejorar cólicos menstruales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Funciona por 3 a 8 años, dependiendo del DIU que elijas. • Puedes pedirle a tu proveedor de salud retirarlo en cualquier momento. Algunas personas prefieren quitárselo sí mismos. • No lo sentirás dentro de tu cuerpo. • Puedes usar algunos como anticoncepción de emergencia. • Puede causar hinchazón, náuseas, o dolor en la cabeza o en los pechos. • La colocación puede doler. Pregunta a tu proveedor de salud sobre formas de hacerlo más cómodo. • Después de retirar el DIU, puedes quedar embarazada inmediatamente. • Contiene la hormona progestina. 	<p>Menos de 1 de cada 100 personas queda embarazada.</p>
<p>DIU de cobre ParaGard®</p>  	<p>Este pequeño dispositivo en forma de T es colocado en el útero por un proveedor de salud.</p> <p>Una vez que lo tienes, no tienes que hacer nada para que funcione.</p> <p>Por lo general, un proveedor de salud lo retira.</p>	<p>Puede causar cólicos más fuertes, y un sangrado mensual más abundante y que dure más tiempo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Funciona por 12 años o más. • Puedes pedirle a tu proveedor de salud retirarlo en cualquier momento. Algunas personas prefieren quitárselo sí mismos. • No sentirás el DIU dentro de tu cuerpo. • Puedes usar el DIU como anticoncepción de emergencia. • La colocación puede doler. Pregunta a tu proveedor de salud sobre formas de hacerlo más cómodo. • Después de retirar el DIU, puedes quedar embarazada inmediatamente. 	<p>Menos de 1 de cada 100 personas queda embarazada.</p>
<p>Espermicida Crema, gel, esponja, espuma, supositorio, lámina</p>   	<p>Inserta la espermicida profundamente en la vagina cada vez antes de tener sexo.</p>	<p>No</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dura hasta 30 minutos. • Algunos tipos funcionan inmediatamente, otros empiezan a funcionar después de 10 minutos • Puedes comprarlo en muchas tiendas. • Puedes ponerlo como parte del juego previo. • Viene en muchas formas: crema, gel, esponja, espuma, supositorio, lámina. • Puede irritar la vagina y/o el pene. Puede ayudar cambiando de marca. • El derrame de la crema, el gel o la espuma se puede ensuciar. • Puede aumentar el riesgo de contraer el VIH si la usa con frecuencia. 	<p>28 de cada 100 personas quedan embarazada.</p>
<p>Esterilización: Ligadura de trompas</p>  	<p>Estos métodos bloquean o cortan las trompas de Falopio para que los óvulos no puedan reunirse con el esperma.</p> <p>Durante el procedimiento, un proveedor de salud llega a las trompas a través de la barriga.</p>	<p>No</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es permanente. • Debe ser realizado en la sala de operaciones de un hospital. • Funciona inmediatamente. • Durante el procedimiento, el proveedor de salud puede: colocar hules o clips en las trompas, usar calor para cerrar las trompas, remover un pedazo de cada trompa, o quitar las trompas completamente. • Es muy difícil de revertir. Algunos procedimientos no se pueden revertir. • Puede causar dolor después del procedimiento y puedes necesitar tiempo para recuperarte. • Las complicaciones raras incluyen infección, sangrado, dolor, y reacciones a la anestesia. 	<p>Menos de 1 de cada 100 personas queda embarazada.</p>

Método	Cómo usarlo	¿Cambia el sangrado mensual?	Cosas que debes saber	¿Qué tan bien funciona?
Esterilización: Vasectomía  	<p>Este método, un proveedor de salud corta los conductos en el escroto. Esto evita que la esperma salga de los testículos.</p>	No	<ul style="list-style-type: none"> • Es permanente. • Se puede hacer en una oficina médica. • Tarda hasta 3 meses en hacer efecto. • Más efectivo, seguro, y barato que la ligadura de trompas. • No requiere anestesia general. • Es difícil de revertir y no siempre funciona. • Puede causar dolor después del procedimiento y puedes necesitar uno o dos días para recuperarse. • Las complicaciones raras incluyen infección, dolor que no mejora, y sangrado. • Debe ir a un proveedor de salud entrenado para una vasectomía. 	Menos de 1 de cada 100 personas causa un embarazo.
Implante Anticonceptivo Nexplanon®  	<p>Un proveedor de salud coloca esta varilla de plástico fino bajo la piel del brazo.</p> <p>Una vez que lo tienes, no tienes que hacer nada para que funcione.</p> <p>Un proveedor de salud debe retirarlo.</p>	<p>Puede causar manchas de sangre frecuente que es difícil de predecir.</p> <p>Sangrado mensual puede ser prolongado, corto, o parar completamente.</p> <p>Puede mejorar los cólicos menstruales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Funciona para 5 años. • Puedes pedir a tu proveedor de salud retirarlo en cualquier momento. • La mayoría de los implantes no se pueden ver, pero puedes sentirlo si tocas la piel que lo cubre. • Puede causar cambios de humor, aumento de peso, acné, dolor de cabeza, o cambios en la piel de la parte superior del brazo. • Después de retirar el implante, puedes quedar embarazada inmediatamente. • Contiene la hormona progestina. 	Menos de 1 de cada 100 personas queda embarazada.
Inyección Depo-Provera®  	<p>Recibes una inyección cada 3 meses (13 semanas).</p> <p>Hazte la inyección o recíbela en el centro de salud o la clínica.</p>	<p>Puede causar manchas de sangre, ausencia total de sangrado, o un sangrado más prolongado. Después de dejar la inyección, puede durar hasta un año y medio para que tu menstruación regrese a lo normal.</p> <p>Puede mejorar cólicos menstruales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cada inyección funciona hasta 15 semanas. • Puede mejorar síntomas de síndrome premenstrual. • Puede causar aumento de peso, hinchazón, dolor de cabeza, o cambios de humor. • Tus huesos pueden volverse ligeramente más delgados mientras te recibes la inyección. Esto vuelve a la normalidad una vez que deja las inyecciones. • Pueden tardar meses para embarazarse después de dejar las inyecciones. • Contiene la hormona progestina. 	4 de cada 100 personas quedan embarazadas.
Parche Xulane® (Zafemy), Twirla  	<p>Coloca un parche nuevo cada semana por tres semanas seguidas.</p> <p>No uses el parche en la cuarta semana.</p> <p>Coloca el parche en cualquier lugar en la parte superior externa del brazo, estómago, nalga, o espalda.</p>	<p>Puede hacerlo el sangrado mensual más regular, ligero, y corto.</p> <p>Puede causar manchas de sangre.</p> <p>Puede mejorar los cólicos menstruales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Necesitas receta médica. • Puede ayudar con el acné. • Puede irritar la piel debajo del parche. • Puede causar náusea o dolor en los pechos. • No utilizar durante las primeras 3 a 6 semanas después del parto. • Después de dejar el parche, puedes quedar embarazada inmediatamente. • Contiene las hormonas estrógeno y progestina. 	7 de cada 100 personas quedan embarazadas.
Pastillas anticonceptivas Sprintec, OrthoCyclen, Junel FE, Apri  	<p>Toma una pastilla todos los días.</p> <p>Después de terminar un paquete, comienza un paquete nuevo al día siguiente.</p>	<p>Puede hacer el sangrado mensual más regular, ligero, y corto.</p> <p>Puede causar manchas de sangre.</p> <p>Puede mejorar los cólicos menstruales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Necesitas receta médica. • Puede ayudar con el acné. • Después de dejar las pastillas, puedes quedar embarazada inmediatamente. • Puede causar náusea o dolor en los pechos. • Algunos efectos secundarios pueden mejorar cambiando a otra marca. • Contiene las hormonas estrógeno y progestina. 	7 de cada 100 personas quedan embarazadas.

Método	Cómo usarlo	¿Cambia el sangrado mensual?	Cosas que debes saber	¿Qué tan bien funciona?
<p>Pastilla anticonceptiva de emergencia (AE)</p> <p>AE de progestina (Plan B One-Step® y otras) y acetato de ulipristal (ella®)</p>  	<p>Toma las pastillas AE lo mas pronto posible después de tener sexo sin protección.</p> <p>Funciona mejor si tomas las pastillas lo más pronto posible.</p> <p>Pueden funcionar hasta 5 días después de sexo sin protección.</p> <p>Si el paquete contiene 2 pastillas, toma las dos juntas.</p>	<p>El próximo sangrado mensual puede llegar temprano o tarde.</p> <p>Puede causar manchas de sangre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hay dos tipos de pastillas AE. Uno tiene la hormona progestina y uno tiene ulipristal. Puedes obtener AE de progestina sin receta médica. Necesitas una receta médica para obtener AE de ulipristal. Se vende AE de progestina en las farmacias, tiendas, y en línea. Algunos campus universitarios y departamentos de salud venden AE en máquinas expendedoras. Puede causar náusea, dolor de cabeza, mareos, dolor de barriga, o dolor de pechos por 1-2 días. La AE de progestina funciona menos si tu índice de masa corporal (IMC) es mayor de 25. La AE de ulipristal funciona menos si tu IMC es mayor de 30. Puedes hacerte una prueba de embarazo 2-3 semanas después para asegurarte que la pastilla AE funcionó. 	<p>Funcionan mejor lo más pronto posible.</p>
<p>Pastillas anticonceptivas que sólo contienen progestina</p> <p>Slynd, Camila, NorQD, Opill®</p>  	<p>Toma una pastilla a la misma hora cada día.</p> <p>Después de terminar un paquete de pastillas, comienza un paquete nuevo al día siguiente.</p>	<p>Puede hacer el sangrado mensual más ligero y corto.</p> <p>Puede causar manchas de sangre.</p> <p>Puede mejorar los cólicos menstruales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Opill es la única marca disponible sin receta médica. Puedes obtener Opill en las farmacias, tiendas, y en línea. Puedes obtener otras marcas con una receta médica. Puede causar náusea o dolor en los pechos. Después de dejar las pastillas, puedes quedar embarazada inmediatamente. Contiene la hormona progestina. 	<p>7 de cada 100 personas quedan embarazadas.</p>
<p>Phexxi®</p>  	<p>Inserta el gel usando el aplicador profundamente en la vagina, como un tampón, cada vez antes de tener sexo.</p>	<p>No</p>	<ul style="list-style-type: none"> Funciona inmediatamente y dura hasta 1 hora. Necesitas receta médica. Puedes ponerlo como parte del juego previo. Puede irritar la vagina y el pene. No se debe usar si has tenido muchas infecciones vaginales urinarias, u otros problemas del tracto urinario. 	<p>14 de cada 100 personas quedan embarazadas.</p>
<p>Planificación Familiar Natural</p>   	<p>Identificar tus días fértiles (los días cuando haya más probabilidad de quedar embarazada): toma tu temperatura diariamente, chequea cambios en tu moco vaginal, nota tus días de sangrado mensual, o haz pruebas hormonales de orina en casa.</p> <p>Evita tener relaciones sexuales (pene-en-vagina) en días fértiles o usa condón.</p>	<p>No</p>	<ul style="list-style-type: none"> Puede ayudar a evitar o intentar el embarazo. Funciona mejor si tus ciclos menstruales son regulares. Hay muchas aplicaciones que te ayudan. Funciona mejor usando más de un método: <ul style="list-style-type: none"> Temperatura: Usa un termómetro especial (de temperatura basal) y tómala a primera hora de la mañana. Puedes obtener este termómetro en muchas tiendas o en línea. Pruebas hormonales de orina: Haz la prueba a primera hora de la mañana. Puedes obtener las tiras en muchas tiendas o en línea. Moco vaginal: Necesitas ver y tocar el moco cada día. 	<p>Algunos de estos métodos funcionan mejor que otros.</p> <p>2-34 en cada 100 personas quedan embarazadas.</p>
<p>Retiro</p> <p>Eyacuación Fuera de la Vagina</p>  	<p>Retire el pene de la vagina antes de eyacular (es decir, antes de tener el orgasmo).</p>	<p>No</p>	<ul style="list-style-type: none"> No cuesta nada. Hay menos placer para algunas personas. No funciona si no se retira el pene a tiempo. Debe interrumpir el sexo. 	<p>20 de cada 100 personas quedan embarazadas.</p>